

吳鞠通先生醫案

吳鞠通先生醫案 卷三

目錄

頭痛

胃痛

脾胃

噎食

嘔吐

反胃

噦

咳嗽

肺癰

失音

水氣

寒溼

痺

痰飲

吳鞠通先生醫案卷三

頭痛

乙丑三月 趙氏五十六脈弦而遲顛頂痛甚下連太陽陽虛內風眩動之故

桂枝 六錢 生黃蓍 六錢 生薑 五錢 白芍 三錢 全當歸 二錢

大棗 三枚 炙甘草 三錢 川芎 一錢 膠飴 五錢

初十日 陽虛頭痛愈後用舊建中

桂枝 四錢 生絲蓍 五錢 生薑 三片 白芍 六錢

大棗 三枚 炙甘草 三錢 膠飴 五錢

季少陽頭痛本有損一目之弊無奈盲醫不識混用辛溫反助少陽之火甚至有用附子之雄烈者無怪乎醫者盲致令病者亦盲矣況此病由於伏

後學 高隱僧汝 裴吉生慶元校刊

暑發瘧瘧久不愈抑鬱不舒而起肝之鬱勃難伸肝愈鬱而膽愈熱矣現
在仍然少陽頭痛未罷議仍從少陽膽絡論治

刺蒺藜 五錢 麥冬 五錢 不去心 茶菊花 三錢 羚羊角 三錢 苦桔梗 三錢

鈎藤鈎 三錢 丹皮 三錢 青箱子 二錢 苦丁茶 一錢 麻仁 三錢

生甘草 一錢 桑葉 三錢

乙丑十月 陳 三十歲 少陽風動又襲外風爲病頭偏左痛左脈浮弦而數大於
右脈一倍最有損一目之弊議急清膽絡之熱用辛甘化風方法

羚羊角 三錢 丹皮 五錢 青箱子 二錢 苦桔梗 三錢 茶菊花 三錢

鈎藤鈎 二錢 薄荷 二錢 刺蒺藜 二錢 生甘草 一錢 桑葉 三錢

水五盃煮取兩盃分二次服渣再煮一盃服

日二帖

廿五 於前方內減薄荷一錢四分加 木賊草 一錢 薤仁 三錢

頭痛眼蒙甚日三帖少輕日二帖

十一月於前方內加 薏仁 白茅根 麥冬

乙酉四月章 四十歲 衄血之因由於熱行清道法當以清輕之品清清道之熱

無柰所用皆重藥至頭偏左痛乃少陽膽絡之熱最有損一日之患豈熟

地桂附鹿茸所可用悖謬極矣無怪乎深痼難拔也勉與清少陽膽絡法

當用羚羊角散以無羚羊故不用

苦梗 一兩 桑葉 一兩 連翹 八錢 銀花 八錢 丹皮 八錢 薄荷 二錢

茶菊花 一兩 鉤藤鈎 六錢 白蒺藜 四錢 苦丁茶 三錢 甘草 四錢

其爲極細末每服二錢日三次每服白扁豆花湯調外以豆漿一擔熬

至梔許攤貼馬刀患處以化淨爲度必須鹽滷點之做豆腐水並非可吃之豆腐漿

廿七日 復診症見小效脈尙仍舊照前清少陽膽絡方再服二三帖俟大效後再

議如此時無扁豆花爲引改用鮮荷邊煎湯爲引亦可

五月初二日 少陽絡熱誤用峻補陽氣以致頭目左畔麻木發癢耳後癰腫發爲馬

乃現在六脈沈洪而數頭目中風火相煽前用羚羊角散法雖見小效而不能大愈議加一煎方暫清腦戶之風熱其散方仍用勿停

苦桔梗 三錢 生黃芩 三錢 茶菊花 三錢 側柏葉炭 三錢 炒蒼耳子 一錢五分

連翹 三錢 連心桑葉 三錢 辛夷 一錢五分 鮮荷葉 去蒂 一張 黑山梔 五枚 大便秘 去山梔

六月初五日 細閱病狀由少陽移熱於陽明 生石膏 一兩 知母 三錢 葛根 三錢

十二日 偏頭痛係少陽膽絡病醫者誤認為虛而用鹿茸等峻補其陽以致將少

陽之熱移於陽明部分項腫牙痛半邊頭臉腫痛目白睛血赤且閉不得開如溫毒狀舌苔紅黃六脈沈數有力議與代賑普濟散急急兩清少陽陽明之熱毒

代賑普濟散 十包每包五錢用鮮蘆根煎湯水二盃煮成一盃去渣

十六日 先服半盃其下半盃含化得稀涎即吐之一時許再煎一包服如上法
舌黃更甚脈猶數腫未全消目白睛赤纓白下而上其名曰倒垂簾治在

陽明不比自上而下者治在太陽也

代賑普濟散 每日服五包嚙下大半漱吐小半每包加生石膏三錢

煎成一小碗服二日外以連心麥冬一兩分二次煎代茶

十八日 今日偏頭痛甚且清少陽之絡其消腫之普濟散加石膏午前服一包餘

時服此方

羚羊角 一錢 連翹 一錢 刺蒺藜 六分 凌霄花 一錢 鈎藤鈎 六分

茶菊花 一錢 銀花 一錢 苦桔梗 八分 冬霜葉 一錢 生甘草 四分

犀角 八分 丹皮 一錢 兩盃半水煎一盃頓服之日三帖

二十日 大便結加 元參 二錢 糖則去之

廿三日 經謂脈有獨大獨小獨浮獨沈斯病之所在也茲左關獨大獨浮膽陽太

旺清膽絡之熱已服過數十帖之多而膽脈尙如是之旺絡藥輕清上浮服至何日得了議膽無出路借小腸以爲出路小腸火腑非苦不通暫與

極苦下奪法然此等藥可暫而不可久恐化燥也

洋蘆薈 二錢

麥冬 連心 五錢

川連 二錢

胡黃連 二錢

龍膽草 二錢

丹皮 五錢

秋石 一錢

廿六日

前方服二帖左關獨大獨浮之脈已平續服羚羊角散一天代賑普濟散

一天目之赤縷大退其耳前後之馬刀堅硬未消仍服代賑普濟散

日四次

七月初一日

脈沈數馬刀之堅結未化少陽陽明經脈受毒之處猶然繃扯板滯議

外面改用水仙膏敷患處每日早服羚羊角散一帖已午後服代賑普濟

散四包

初九日

服前藥喉嚨較前甚為清亮舌苔之黃濁去其大半脈漸小仍敷裏症日

輕是大佳處外症以水仙膏拔出黃瘡若許毒氣尚未化透仍須急急再

敷務期拔盡方妙至於見功遲緩乃前人誤用峻補之累速速解此重圍

非旦晚可了只好寧耐性情寬限令其自化太緊恐致過剛則折之虞前

羚羊角散每日午前服一帖午後服代賑普濟散四包分四次再以二三包煎湯漱口以護牙齒

十七日 數日大便不爽左脈關部復浮瘡口痛甚再用極苦以瀉小腸加芳香活

絡定痛

生大黃 酒炒黑 三錢 龍膽草 三錢 乳香 三錢 歸尾 三錢 沒藥 二錢

洋蘆薈 二錢 胡黃連 三錢 銀花 五錢 川連 二錢 秋石 三錢

煮三小盃分三次服得快大便一次即止

十八日 馬刀雖潰少陽陽明之熱毒未除兩手關脈獨浮膽氣太旺與清少陽陽

明絡熱之中兼疏肝鬱頓堅化核

苦桔梗 三錢 金銀花 三錢 夏枯草 三錢 生香附 三錢 連翹 二錢

冬霜葉 三錢 凌霄花 三錢 茶菊花 三錢 粉丹皮 五錢 海藻 二錢

廿五日 馬刀以誤補太重而成爲日已久一時未能化淨以畏疼停止水仙膏之

故舌上白苔浮而微黃其毒尙重現在胃口稍減水來克土之故於前方

加宣肝鬱

銀花 三錢 丹皮炭 三錢 香附 二錢 桑葉 三錢 連翹 三錢 茶菊花 二錢

苦梗 二錢 廣鬱金 二錢 仍以代賑普濟散漱口勿嚥

廿八 肝鬱誤補結成馬刀目幾壞現在馬刀已平其半目亦漸愈服之數者已

平惟左關獨浮其性甚急肝鬱總未能降胃不甚開胸中飯後覺痞舌白

滑微黃皆木旺尅土之故其敗毒清熱之涼劑暫時停止且與兩和肝胃

新絳紗 三錢 姜半夏 三錢 粉丹皮 三錢 廣皮炭 二錢 歸橫嶺 二錢

旋覆花 三錢 包煎 廣鬱金 二錢 降香末 一錢 蘇子霜 一錢

三月初 少陽相火誤補成馬刀原應用涼絡柰連日白苔太重胃不和暫與和

胃現在舌苔雖化納食不旺而嘔未可用涼恐傷胃也於前方減其製

新絳紗 三錢 半夏 五錢 黃芩炭 二錢 廣鬱金 二錢 生薑汁 三匙

旋覆花 三錢 包煎 丹皮 三錢

仍用代賑普濟散漱口

初六 於前方內去黃芩加 香附 三錢 廣皮炭 二錢

初八 肝移熱於腦下為鼻淵則鼻塞不通甚則衄血議清腦戶之熱以開鼻塞

兼宣少陽絡氣外有馬刀故也

銀花 二錢 蒼耳子 四錢 炒 辛夷 四錢 炒去毛 連翹 二錢 茶菊花 三錢 桑葉 三錢

又 於前方內加 旋覆花 三錢 包煎 廣鬱金 二錢 疏肝鬱加 姜半夏 二錢 止嘔

十三 馬刀已出大膿左脇肝鬱作痛痛則大便日下六七次其色間黃間黑時

欲嘔有大瘕泄之象與兩和肝胃

新絳紗 三錢 炒黃芩 二錢 降香末 三錢 香附 三錢 歸身 二錢 薑汁 三匙

旋覆花 三錢 包煎 廣鬱金 二錢 焦白芍 三錢 姜半夏 四錢 廣皮炭 三錢

十九 外症未除內又受伏暑成痢舌白苔黃滑小便不暢大便五七次有黑有

白便又不多非積滯而何不惟此也時而嘔水與痰胃又不和內外夾攻

何以克當勉與四苓合苓芍湯法

雲苓皮 五錢 猪苓 三錢 炒黃芩 二錢 澤瀉 三錢 姜半夏 五錢 紅麴 二錢

炒白芍 三錢 炒廣皮 三錢 姜炒川連 一錢 五分 廣木香 二錢 降香末 二錢

廿四 病由膽而入肝客邪已退所見皆肝膽病外而經絡內而臟腑無所不病

初診時卽云深痼難拔皆誤用大熱純陽之累所謂雖有善者亦無如之何矣再勉與瀉小腸以瀉膽火法

龍膽草 三錢 連翹 三錢 茶菊花 三錢 眞雅連 一錢 五分 炒黃芩 三錢

姜半夏 三錢 竹茹 三錢 冬霜葉 三錢 烏梅 三錢 去核

廿六 脈少大而數卽於前方內加 苦桔梗 三錢 金銀花 三錢 雲苓皮 三錢

廿九 脈仍數肝膽俱病不能純治一邊

金銀花 三錢 姜半夏 三錢 川連 五分 黃芩 六分 連翹 三錢

茶菊花 三錢 冬霜葉 三錢 烏梅 三錢 雲苓 三錢 麥冬 三錢 連心 五錢

九月十一日 前方服十一帖胃口大開舌苔化盡肝氣亦漸和惟馬刀之核未消盡

鼻猶塞脣猶強變鰓爲鯢脈弦數大便秘議於原方內去護土之剛藥加入腦戶之絡藥蓋由風熱蟠聚於腦戶故身寒而鰓或鯢誤補而邪不得出也

連翹心

三錢

銀花

三錢

烏梅

三錢

蒼耳子

三錢

麥冬

五錢

苦桔梗

三錢

辛夷

三錢

川連

二錢

茶菊花

三錢

桑葉

三錢

龍膽草

一錢

黃芩

二錢

人中黃

一錢

五分

廿八

開來札前方服七帖肺胃之火太甚議於原方內加

生石膏

一兩

杏仁

二錢

開天氣以通鼻竅清陽明以定牙痛加二三帖不知酌加石膏漸至

二兩

再敷水仙膏以消核之未盡

廿九

右脈洪大而數渴欲飲水牙牀腫甚陽明熱也於前方內加

石膏

共二兩銀花

二錢

桑葉

二錢各

共五錢如服三五帖後腫不消加石膏至四兩

吳氏醫案

頭痛

六

丁亥八月 長氏 五十 先牙痛陽明熱也繼因怒而偏頭痛少陽熱也痛甚而厥

口歪謔清少陽陽明兩經之絡熱

金銀花 三錢 茶菊花 三錢 桑葉 三錢 連翹 三錢 不去心

鈎藤鈎 三錢 生石膏 六錢 苦梗 三錢 黃芩炭 二錢

丹皮 五錢 兒茶 二錢 甘草 二錢

牙疼甚加此疼止去此

胃痛

甲子十月 廿七日 伊氏 三十 脈弦急脇脹攻心痛痛極欲嘔甫十五日而經水暴至甚

多幾不能起不欲飲少腹墜脹而痛此怒鬱傷肝暴注血海肝厥犯胃也
講胞宮陽明同治法蓋金匱謂胞宮累及陽明治在胞宮陽明累及胞宮
治在陽明茲因肝病下注胞宮橫穿土位兩傷者兩救之仍以厥陰爲主
雖變金匱之法而實法平金匱之法者也

白烏藥二錢 半夏五錢 小茴香二錢 製香附三錢 血餘炭本人之髮更佳三錢

廣鬱金二錢 青皮八分 五靈脂一錢五分 黃芩炭一錢 艾炭三錢

水五盃煮取兩盃分二次服

廿九日 金匱謂胞宮累及陽明則治在胞宮陽明累及胞宮則治在陽明茲肝厥

既克陽明又累胞宮必以厥陰為主而陽明胞宮兩護之

製香附三錢 半夏五錢 白烏藥二錢炒 桂枝三錢 草薢二錢 艾炭一錢五分

杜仲炭二錢 淡吳萸二錢 黑梔子三錢 川棟子三錢 小茴香三錢

水五盃煮取兩盃分二次服

甲子十月廿九日 尹氏二十歲脈雙弦而細肝厥犯胃以開朗心地為要緊無使久而成

患也

降香末三錢 半夏六錢 烏藥二錢 廣皮一錢五分 廣鬱金二錢

淡吳萸二錢 川椒炒黑二錢 青皮一錢五分 生薑三片 川棟皮二錢

水五盞煮取兩盞分二次服三帖

甲子十一月初四日 玉氏

六歲

肝厥犯胃濁陰上攻萬不能出通陽泄濁法外但分輕重

耳前三方之所以不大效者病重藥輕故也茲重用之

姜半夏

五錢

厚樸

三錢

降香末

三錢

川椒炭

五錢

台烏藥

三錢

淡吳茱

五錢

良姜

五錢

小枳實

三錢

雲連

一錢

兩頭尖

揀淨兩頭

圓三錢

用甘瀾水八碗煮取三碗分六次服

初六日

重剛劫濁陰業已見效當小其製

姜半夏

三錢

台烏藥

二錢

厚樸

二錢

良姜

三錢

川椒炭

三錢

小枳實

二錢

青皮

二錢

廣皮

一錢

五分

用甘瀾水八碗煮取三碗分三次服二帖

車

脈沈弦而緊嘔而不渴肢逆且麻濁陰上攻厥陰剋陽明所致宜急溫之

台烏藥

三錢

淡吳茱

五錢

半夏

五錢

厚樸

三錢

薑撥

二錢

小枳實 三錢 川椒炭 三錢 乾姜 三錢 青皮 二錢

頭煎兩盃二煎一盃分三次服

脾胃

癸亥二月 二十日 許

四十歲 脈弦而緊弦則木旺緊則為寒木旺則土衰中寒則陽不

運土衰而陽不運故吞酸噫氣不寐不食聚便九竅不和皆屬胃病濁陰
蟠踞中焦格拒心火不得下達則心熱如火議苦辛通法

半夏 二兩

小枳實 三錢

廣皮 二錢

薤仁 五錢

厚樸 三錢

淡吳萸 三錢

生薑 六片

炒雲連 二錢

用甘瀾水八碗煮成三碗分三次服渣再煮一碗服

日四

六脈陽微濁陰蟠踞不食不飢不便用和陽明兼驅濁陰法今腹大痛已

歸下焦十餘日不大便肝病不能疏泄用驅濁陰通陰絡法又苦辛通法

兼以濁攻濁法

台烏藥 二錢 厚樸 三錢 淡吳萸 三錢 川棟子 三錢 小茴香 炒黑 三錢

兩頭尖 三錢 棟子 二錢 小枳實 二錢 炒良姜 二錢 廣皮 一錢 五分

以得通大便爲度

廿七 服以濁攻濁法大便已通但欲便先痛便後痛減責之絡中宿積未能通

清膳上且有動氣又非湯藥所能速攻攻急恐有瘕散爲蠱之虞釀化瘕
回生丹緩攻爲妙

某 脈沈緊爲裏寒木旺土衰濁陰上攻腹拘急時痛脇脹腰痛譙苦辛通法
兼醒脾陽

藿香梗 三錢 厚樸 二錢 生香附 三錢 生薏仁 三錢

廣鬱金 二錢 官桂 一錢 姜半夏 三錢 廣木香 八分

白蔻仁 一錢 藳撥 一錢 台烏藥 一錢 廣皮 一錢 五分

初五 某 脈弦細而緊濁陰上攻胸痛用辛香流氣法

川棟子 三錢 良姜 三錢 厚樸 二錢 烏藥 二錢 淡吳萸 三錢 枳榔 一錢五分

小枳實 二錢 藜蘆 二錢 廣皮 一錢 廣木香 一錢 三帖

初八 補火生土兼泄濁陰

茯苓塊 三錢 台烏藥 二錢 淡乾姜 一錢 益智仁 煨一錢五分

生薏仁 三錢 半夏 三錢 陳皮 一錢五分 淡吳萸 二錢 四帖

乙酉五月 李 十三歲 六脈俱弦不浮不沈不數舌苔白而滑不食不飢不便不

脈九竅不和皆屬胃病卧時自覺氣上阻咽致令卧不着席此肝氣之逆也額角上有蟲斑神氣若昏目閉不欲開視不遠醫云有蟲亦復有理議

先與兩和肝胃如再不應再議治蟲

半夏 一兩 旋覆花 五錢 包煎 秫米 一合

二十 六腑不通九竅不和醫者不知六腑為陽以通為補每見其二便閉也則

以大黃蘗仁寒藥下之以後非下不通屢下屢傷遂致神氣若昏目閉不

開脈弦緩而九竅愈不通矣已成壞症勉與通陽

姜半夏 三錢 雲苓皮 三錢 厚樸 三錢 白蔻仁 二錢

益智仁 二錢 雞內金 二錢 廣皮 二錢 大腹皮 三錢

廿三 六腑閉塞不通有若否卦之象按否之得名以坤陰長陽消之候將來必

致上下皆坤而後已坤爲腹故腹大無外坤爲純陰初爻變震爲復然則欲復其陽非性烈如震者不可豈大黃等陰寒藥所可用哉

天台烏藥散 二錢 加巴霜 二分 和勻分三份先服一分候五時不便

再服第二份得快便即止

廿四 服一次五時得快便宿物下者甚多目之閉者已開神氣亦清稍食粥飲

知預笑矣

廿五 六腑不通溫下後大便雖通而小便仍然未解心下窒塞不飢不食六脈

弦遲急急通陽爲要與開太陽關陽明法

半夏五錢 雲苓皮五錢 良姜二錢 猪苓三錢 川椒炭三錢

安桂一錢 公丁香一錢 澤瀉三錢 廣皮三錢

六月初一日 大便已能自解胃能進食是陽明已闔惟小便不通是太陽不開與專

開太陽

雲苓皮五錢 桂枝三錢 猪苓三錢 安邊桂一錢五分

晚蠶沙三錢 蒼朮二錢 澤瀉三錢 飛滑石三錢

煮三盃分三次服以小便通爲度若小便已通而尙渾濁者再服一帖
以小便清爲度

初六日 服前方二帖小便暫通連日大小便復閉大便不通已七日自覺胃中痞
塞臉上齒斑未退議用前配成之烏藥散再服四份如二便俱通卽停藥
統俟初八日清晨再商如大便通一次而小便不通或大便竟不通明日
再服三份若大便二三次而小便仍然不通者卽勿服

初八日服烏藥散四分內巴霜四厘已得快便今朝且能自行小便六腑俱通矣

只與和胃令能進食可以收功蓋十二經皆取決於膽皆秉氣於胆也

雲苓塊 四錢

益智仁 一錢

半夏 三錢

生薏仁 五錢

廣皮炭 二錢

生姜 五錢

慶室女十六歲不食十餘日諸醫不效面赤脈洪與五汁飲降胃陰法兼服牛乳

三日而大食矣

甘蔗汁 梨汁 蘆根汁 葶薈汁 藕汁 各等分拌勻

邱十八歲溫熱愈後午後微熱不除脈弦數面赤與五汁飲三日熱退進食七

日全愈

噎食

王左尺獨大腎液不充腎陽不安其位尺脈以大爲虛經所謂陰衰於下者是也右手三部俱弦食入則痛經所謂結陽於上者是也有陰衰而累及

陽結者有陽結而累及陰衰者此症形體長大五官俱露木火通明之象凡木火太旺者其陰必素虛古所謂瘦人多火又所謂瘦人之病慮虛其陰凡噎症治法必究陰衰陽結何者爲先何者爲後何者爲輕何者爲重此症既係陰虛爲本陽結爲標何得妄用大黃十劑之多雖一時暫通陽結其如陰虛而愈虛何業醫者豈不知數下亡陰乎且雲岐子九法大半皆攻俞嘉言痛論其非醫者豈非之見邪愚謂因怒停食名之食隔或可一時暫用大黃亦不得恃行數用今議五汁飲果實之甘寒牛乳血肉之變化降胃陰以和陽結治其標大用專翁大生膏峻補肝腎之陰以救陰衰治其本再能痛戒怒惱善保天和猶可望愈

專翁大生膏方 酸甘鹹腥臭直達下焦法

大熟地 四斤 海參 四斤 山萸肉 二斤 揀洋參 四斤 鱉甲 四斤
桂圓肉 二斤 鮑魚 四斤 提麥冬 四斤 杭白芍 四斤 牡蠣 四斤

龜版膠

四斤

雲苓

四斤

猪脊髓

一斤

烏骨雞

一對

蓮子

四斤

沙蒺藜

四斤

芡實

二斤

羊腰子

三十對

眞阿膠

四斤

白蜜

四斤

雞子黃

六十箇

取盡汁

文火煎煉成膏

癸亥十月十三日

李

五十五歲

大凡噎症由於半百之年陰衰陽結古來紛紛議論各疎

所長俱未定宗大抵偏於陽結而陰衰者宜通陽氣如旋覆代赭湯進退

黃連湯之類偏於陰衰而陽結者重在陰衰斷不可見一毫香燥如丹溪

之論是也又有食隔宜下痰隔宜導血隔宜通絡氣隔宜宣肝嘔吐太過

而傷胃液者宜牛轉草覆其液老僧寡婦強制太過精氣結而成骨橫處

幽門宜驚血以化之厨役受穢濁之氣傷肺酒肉勝食氣而傷胃宜化清

氣不可勝數按此症脈沈數有力而渴面色蒼而兼紅甫過五旬鬚髮皆

白其爲平日用心太過重傷其陰而又伏火無疑議且用玉女煎法

煨石膏

八錢

麥冬

不去心

牛膝

三錢

旋覆花

新絳紗

包三錢

大熟地 六錢
白粳米 一撮
知母 二錢
炙甘草 三錢

每早服牛乳一茶碗

甲子二月 張 六十 老年陽結又因久飲怒鬱肝旺尅土氣上阻咽致成噎食

按陽氣不虛不結斷非破氣可療議一而通補胃陽一而鎮守肝陰法

代赭石 煨一兩 半夏 一兩 姜炒洋參 二錢 桂枝 六錢

旋覆花 五錢 生薑 六錢 茯苓塊 四錢 七帖

二十 陽脈已起恐過潤其液議進陰藥退陽藥

代赭石 煨一兩 半夏 六錢 炒白芍 六錢 旋覆花 六錢 洋參 四錢

炙甘草 三錢 桂枝 三錢 茯苓塊 三錢 薑汁 每盃沖 三小匙

廿五 前日脈數因退陽進陰今日脈緩而痰多仍須進陽俾中焦得運以復其

健順有常之體

半夏 一兩 代赭石 一兩 生薑 五片 焦白芍 三錢

傳

桂枝 六錢

茯苓 八錢

洋參 二錢

旋覆花 六錢

包煎 兩帖

五十歲先因酒樓中飲酒食燒小豬響皮甫及下咽卽有家人報知朋友凶信隨卽下樓尋車車夫不知去向因步行四五里尋至其友救難未遇又步行四里又未遇渴急飲冰振島梅湯一二碗然後僱車回家心下隱隱微痛一月後痛有加延醫調治一年未效次年五月飲水一口胃中痛如刀割乾飯不下咽已月餘矣閏五月初八日計一粒不下已十日骨瘦如柴面赤如赭脈沈洪有力胃中痛處高起如桃大按之更痛不可忍余曰此食隔也當下之因用大承湯加牽牛作三碗伊家見方重不敢服求錢而後服一碗痛至臍服二碗痛至小腹服三碗痛至肛門大痛不可忍又不得下於是又作半劑服一碗外加蜜導法始下如雞蛋黑而有毛堅不可破次日先吃爛麪半碗又次日飲粥湯三日食粥五日吃乾飯矣下後所用者五汁飲也

楊

四十歲先因微有痰飲咳嗽誤補於前誤下於後津液受傷又因肝鬱性急致成噎食不食而大便燥六脈弦數治在陰衰

大生地

六錢

麥冬

五錢

麻仁

三錢

廣鬱金

八分

生阿膠

三錢

白芍

四錢

丹皮

三錢

炙甘草

三錢

服七帖而效又於前方加

鱉甲

四錢

杞子

三錢

服十七八帖而大效

進食如常惟餘痰飲後以外臺茯苓飲減廣皮枳實收全功

庚寅五月十八日 陳

三十歲

酒客不戒於怒致成噎食其勢已成非急急離家玩遊山水開懷暢遂斷不為功蓋無情草木不能治有情之病與進退黃連湯法

雲苓塊

四錢

人參

二錢

炙甘草

一錢

旋覆花

新絳紗包四錢

炒黃連

一錢

半夏

四錢

生薑汁

沖三匙

薤白

三錢

煮三盃分三次服

廿二日

效不更方再服四帖

廿八日 卽於前方內加 廣橘皮 三錢 又服四帖

六月初四日 怒鬱兼酒毒與進退黃連湯法業已見效仍宗前法餘有原案

人參 三錢 雲苓塊 四錢 生薑汁 三匙 神麴 三錢 旋覆花 新絳紗包四錢

半夏 四錢 炙甘草 一錢 炒黃連 一錢 薤白 三錢 廣橘皮 三錢

煮三盃分三次服

十二日 諸症雖減六脈弦緊於前方減去黃連加溫藥調和營衛餘有原案

人參 三錢 雲苓塊 四錢 生白芍 三錢 炙甘草 四錢 廣橘皮 三錢

桂枝 三錢 旋覆花 四錢 包煎炒黃連 五分 炙甘草 一錢 大棗肉 二枚

薤白 三錢 神麴 三錢 生薑 三錢 煮三盃分三次服

廿二日 諸症雖減六脈弦緊於前方內去黃連薤白加 代赭石 五錢

五月十日 趙 四十歲 噎食脈弦細脇痛前與宣肝絡其痛已止與代赭旋覆湯治

其噎

代赭石煨飛八錢

人參三錢

姜半夏五錢

炙甘草三錢

旋覆花五錢包煎

洋參一錢

雲苓塊五錢

大棗肉三枚

生薑五錢

煮三盃分三次服

廿四日

續診效不更方再服四帖能用關東參更妙

廿九日

又服四帖

嘔吐

癸亥三月二十日

六十舊有痰飲或發嘔吐仍係痰飲見症醫者不識乃用苦寒

堅陰無怪乎無可存之物矣議食入則吐是無火例

淡吳萸

五錢

半夏

八錢

淡乾姜

五錢

生薏仁

六錢

廣皮

三錢

生薑汁

每次沖三匙

水五盃煮二盃分二次服渣再煮一盃服

廿三日

前方業已見效但脈遲緊與通養胃陽

人參一錢五分

淡吳萸三錢

半夏三錢

生薏仁三錢

吳氏醫案

嘔吐

齒

茯苓二錢

生薑五片

不拘帖

恆氏

七歲

初因大驚肝氣厥逆嘔吐頻仍後因誤補大嘔不止嘔即遷人以剪

刀自刎漸至粒米不下體瘦如柴奄奄一息仍不時干嘔四肢如冰後事

俱備脈弦如絲而勁與烏梅丸法

遼參三錢

川椒炭四錢

吳萸三錢

半夏四錢

薑汁三匙

川連二錢

雲苓塊五錢

烏梅五錢

黃芩炭一錢

服二帖而進米飲服四帖而食粥七帖後全愈後以兩和肝胃到底而

大安

己丑正月
初十日

珠氏

五歲

嘔吐不食已久六脈弦細而弱與安胃丸法

姜半夏

八錢

川椒炭六錢

廣皮五錢

雲苓塊

六錢

烏梅肉四錢

生薑五錢

甘潤水八茶盞煮成三盞分三次服

十四日 嘔吐不食與安胃丸法已效但小便猶短兼有口瘡議兼開太陽

雲苓

半皮半塊六錢

姜半夏 六錢

猪苓 三錢

桂枝 三錢

生薏仁

五錢

吳萸 拌川連炒三錢

澤瀉 三錢

川連 八分炒

川椒炭

四錢

生薑 三錢

煮三盃分三次服

辛卯五月 廿八日 喻

六十歲

肝鬱停痰嘔吐百餘日治不如法肝未愈而胃大傷議與

苦辛以伐肝甘淡以養胃陽

姜半夏

五錢

人參 三錢

淡吳萸 三錢

雲苓 五錢

川椒炭 四錢

炒川連

五錢

生薑汁 三匙

煮三盃分三次服

六月初四日

於前方內減川椒炭一錢淡吳萸一錢加

旋覆花

新絳紗包三錢

香附 三錢

姜半夏 一錢

初六日

肝木橫穿土位嘔逆百餘日不止與苦辛伐肝用甘淡養胃陽已見大效

俟脇下絲毫不用此方鎮肝逆養肝陰補中陽性情之病胸中須海闊

吳氏醫案

嘔吐

五

天空以迓天和

代赭石 八錢 人參 三錢 姜半夏 六錢 雲苓塊 六錢 炙甘草 三錢

旋覆花 三錢 包煎 生薑 三錢 煮三盃分三次服

反胃

甲子十一月廿五日 周 七十歲 老年陽微濁聚以致胸痺反胃三焦之陽齊閉難望有成

議先通胸上清陽

桂枝尖 五錢 半夏 五錢 括蕓 二錢 薤白 三錢 小枳實 八分

白茯苓 二錢 白蜜 半酒盃 厚樸 一錢 薑汁 三小匙

水八盃煮取三盃分三次服

三十日 老年陽微濁聚反胃胸痺用開清陽法業已見效但嘔痰仍多議食入則

吐爲無火例用茱萸湯合大半夏法

吳萸 八錢 半夏 一兩 白蜜 一黃酒盃 洋參 八錢 生薑 一兩

水八碗煮取三碗分三次服渣再煮半碗服

初三日即於前方內加 茯苓塊 五錢

初十日於前方內去吳萸加 薤白 三錢

噦於決切與呃同

癸亥六月 王 三十歲 六脈俱濡右寸獨大溼淫於中肺氣黃鬱因而作噦與傷

寒陽明足太陰之寒噦有間以宣肺氣之痺為主

飛滑石 三錢 竹茹 三錢 白通草 二錢 生薑汁 每盃沖入 三小匙

杏仁泥 三錢 柿蒂 三錢 生薏仁 三錢 廣皮 二錢

十七日泄瀉胸悶於前方內加 茯苓 三錢 藿香梗 二錢

十九日脈之濡者已解寸之大者已平惟胃中有飲隔拒上焦之氣不得下通故

於其旺時而噦甚今從陽明主治

茯苓塊 五錢 半夏 六錢 杏仁泥 二錢 飛滑石 三錢 小枳實 一錢 五分

咳嗽

生薏仁 五錢 廣皮 三錢 藿香梗 三錢 白通草 三錢 柿蒂 三錢 三帖

廿二日 噦雖止而六脈俱數右手更大泄瀉色黑舌黃氣分溼熱可知

連翹 二錢 茯苓皮 五錢 黃芩炭 一錢 銀花 二錢 飛滑石 三錢

厚樸 一錢 扁豆皮 三錢 生薏仁 三錢 澤瀉 三錢 白通草 二錢

煮三盃分三次服三日六帖

咳嗽

甲子四月 廿四日 吳 二十歲 六脈弦勁有陰無陽但咳無痰且清上焦氣分

沙參 三錢 生扁豆 三錢 連翹 一錢五分 麥冬 三錢 冬霜葉 三錢 玉竹 三錢

冰糖 三錢 茶菊花 三錢 杏仁 三錢 煮三盃分三次服三帖

廿六日 於前方內去連翹加 丹皮 二錢 地骨皮 三錢

肺癰

癸亥三月 初八日 王氏 五十歲 初起喉痺為快利藥所傷致成肺癰胸中痛口中燥痺仍

未痊不食不寐痰氣腥臭已有成膿之象脈短而數寒熱且移於大腸而泄瀉難愈之證勉與急急開提肺氣議千金葦莖湯與甘桔合法

苦桔梗 二兩 桃仁 五錢 冬瓜仁 五錢 生薏仁 一兩 甘草 一兩

鮮葦根 四兩 水八碗煮成三碗渣再煮一碗分四次服

己巳年 堂伯兄 四十歲 飲火酒坐熱炕晝夜不寐喜出汗誤服枇杷葉麻黃等利

肺藥致傷津液遂成肺癰臭不可當日吐膿二升許用千金葦莖湯合甘桔法

葦根 八兩 苦桔梗 三兩 桃仁 一兩 薏仁 二兩 冬瓜仁 一兩 生甘 一兩

煮成兩大茶碗晝夜服完碗半膿去十之七八盡劑膿去八九又服半劑毫無臭味後以調理脾胃收功

己卯年 朱詠齋世兄 五十餘歲 以二月初受風與桂枝湯一帖風解膽怯不敢去厚

衣因而汗多初四五等日又受風溫口渴思涼脈洪數先與辛涼輕劑不

脈靜仍膽怯不去厚衣初十日當大內差使坐夜起五更衣更厚遂間不敢去皮衣以致重亡津液而成肺癰與葦莖湯日二三帖服之五七日不癰膿成臭極加苦葶藶子五錢膿始退未能十分淨盡後十日又發膿又成吐如菰豆汁膿臭每吐一椀餘又與前方加葶藶三錢服三帖方平後以補胃逐痰飲收功再其人色白體肥夙有痰飲未病之前秋冬兩季已在 上書房行走早起恐寒誤服俗傳藥酒方本不嗜酒每早強飲數小盃次年患此恙之由也

失音

乙丑二月初二日

朱

右脈洪數有力金實無聲麻杏石甘湯證也奈已爲前醫發汗麻黃未便再用謹清音湯加石杏

半夏

六錢

苦桔梗

六錢

石膏

六錢

杏仁粉

五錢

葦根

五錢

生甘草

一錢

水五盃煮成二盃渣再煮一盃分三次服

初三日肺藏本熱爲外風所搏實而無聲究係厥杏石目之法爲速

生石膏 一兩 麻黃 去節 炙甘草 三錢 杏仁泥 六錢 半夏 五錢

初四日右脈之洪數有力者已減其半而音亦漸開仍用麻杏石甘加半夏一帖

生麻黃 去節 生石膏 一兩 杏仁霜 七錢 姜半夏 七錢 炙甘草 三錢

甘瀾水八碗煮成三碗分三次服以後病減者減其製

乙酉正月廿九日沈 二十歲 六脈弦細如絲陽微極矣咳嗽便溏納食不旺由上焦損

及中焦所以致損之由初因遺精繼因秋傷於溼冬心咳嗽外邪未清驟

然用補使邪無出路致咳嗽不已古謂病有三虛一實者先治其實後治

其虛現在喉啞治實先與開提肺氣治虛與諸虛不足之小建中湯

苦桔梗 四錢 雲苓塊 五錢 杏仁泥 二錢 姜半夏 四錢

生薏仁 五錢 生甘草 二錢 煮二盃分三次服

二月初六日 六脈弦細之極陰陽俱損急須用補以外感未淨喉音未清暫與理肺

二帖後再診

茯苓塊 四錢 苦桔梗 二錢 生甘草 三錢 甜杏仁 四錢 冰糖 四錢

鮮蘆根 四錢 姜半夏 三錢 煮三小盃分三次服

球 四十 酒客失音與麻杏石甘湯

生石膏 四兩 麻黃 五錢 杏仁 四錢 炙甘草 三錢

又 服一帖無汗音不出服二帖微汗音出不甚響仍用前法

蜜炙麻黃 三錢 生石膏 三錢 炙甘草 三錢 杏仁 四錢

又 服五帖音大出但脈滑耳與清音湯

苦桔梗 六錢 姜半夏 六錢 炙甘草 二錢

又 服五帖音清脈涓痰飲不盡與外臺茯苓飲法減辛藥

茯苓 八錢 沙參 三錢 半夏 五錢 廣皮 二錢 甘草 一錢五分

麥冬不去心 小枳實一錢五分 七帖而安

歌兒十五歲 失音歌唱勞陽肺火喉啞

洋參切薄片一兩 鮑魚切薄片四兩

早晚各取鮑魚二錢洋參五分煎湯頓服之歌時取鮑魚洋參各一片貼牙後腮間嚙其津液以後不復啞矣

歌兒十六歲 因飲酒過度貪食水果寒熱相搏溼熱內壅

蘇梗 苦桔梗 神麴 半夏 甘草

蘆根 茯苓塊 服數帖而愈

水氣

甲子三月廿一日 蘭女十四歲 脈數水氣由面腫至足心經謂病始於上而盛於下者先

治其上後治其下議腰以上腫當發汗例越婢加朮湯法

麻黃去節五錢 白朮三錢 杏仁泥五錢 石膏六錢 桂枝三錢 炙甘草一錢

水五盃煮取二盃先服一盃得汗止後服不汗再服

生石膏

八錢

麻黃

去節三錢

生薑

三片

炙甘草

二錢

杏仁泥

五錢

桂枝

二錢

大棗

去核二枚

水八盃煮取三盃分三次服以汗出至足爲度又不可使汗淋漓

廿四

水氣由頭面腫至足下與越婢法上身之腫已消其半茲脈沈而數以涼

淡複微苦利其小便

飛渭石

五錢

生薏仁

五錢

杏仁

三錢

茯苓皮

六錢

黃柏炭

一錢

海金砂

六錢

澤瀉

三錢

白通草

三錢

不能戒鹹不必服藥

甲子三月廿一日

通女

十九歲

右脈大於左浮而緊諸有水氣者腰以上腫當發汗但其

人自汗不得再發咳而勉仍以肺氣爲主用小青龍湯去麻辛

杏仁泥

四錢

半夏

五錢

製五味

一錢

生薏仁

三錢

炙甘草二錢 桂枝三錢 炒白芍一錢五分 乾姜二錢

水五盃煮取二盃分二次服

廿二 於前方內加 茯苓塊五錢

廿四 風水愈後咳亦止多汗議苓桂朮甘湯加黃耆蠲飲而護表

茯苓五錢 生絳耆三錢 炙甘草三錢 桂枝四錢 於朮三錢

煮取二盃分二次服三帖

章

四十 腰以下腫當利小便六脈沈細之極腸鳴色黑陽氣幾微湮沒矣

茯苓皮八錢 桂枝八錢 良姜三錢 生茅朮五錢 澤瀉六錢

老厚樸三錢 猪苓六錢 椒目三錢 安邊桂三錢 廣皮二錢

水八碗煮取三碗渣再煮一碗分四次服以小便利爲度

又 腫脹胸痞用半夏瀉心湯法俟痞愈再服前方

半夏 川連 生薑 黃芩 乾姜

甲子三月某日六日 前因中焦停飲咳嗽轉用溫藥今雖飲咳見效小便究未暢行

脈之沉滯洪較有力症本溼中生熱又有酒毒仍以涼利小便之苦辛淡法

飛滑石 六錢 晚蠶砂 三錢 杏仁 四錢 雲苓皮 五錢 黃柏炭 二錢

海金砂 五錢 生薏仁 四錢 半夏 二錢 白薏仁 一錢 白通草 一錢

冬霜葉 三錢 煮成三盃分三次服

廿八日 風水已愈其半復感風寒身熱頭痛身半以上復腫口渴脈浮數與越婢

加朮法

生石膏 二兩 麻黃 五錢 去節炒蒼朮 三錢 杏仁泥 五錢 桂枝 三錢

炙甘草 二錢 煮成三盃先服一盃得微汗即止

廿九日 風水汗後脈洪數渴而停水腫未全消猶宜涼開膀胱

生石膏 二兩 雲苓皮 五錢 白薏仁 二錢 杏仁泥 五錢 姜半夏 三錢

飛滑石 六錢 小枳實 四錢 晚蠶砂 三錢 生薏仁 三錢 海金砂 五錢

益智仁 三錢 白通草 一錢 猪苓 三錢 廣皮 一錢 煮成三盃分三次服

四月初一日 改用前方去石膏

初二日 水腫未全消脾陽不醒食不能膺糞後見紅

竈中黃土 一兩 飛滑石 五錢 熟附子 二錢 杏仁泥 五錢

雲茯苓皮 五錢 黃芩炭 一錢 海金砂 四錢 白通草 一錢

鷺眼枳實 二錢 生薏仁 五錢 南蒼朮 三錢 煮成三盃分三次服

初五日 小便猶不甚長胃中得熱物微噎右脈滑數

飛滑石 五錢 杏仁 五錢 小枳實 二錢 葶藶 三錢 益智仁 一錢

雲苓皮 五錢 厚樸 一錢 海金砂 五錢 木通 一錢 廣皮炭 一錢

生薏仁 三錢 煮成三盃分三次服

初七日 小便仍未通暢右脈數大未退仍宜涼肺以開膀胱

飛滑石 六錢 杏仁 五錢 晚蠶砂 三錢 雲苓皮 五錢 薏仁 連皮一錢五分

大腹皮 二錢 厚樸 二錢 生薏仁 四錢 海金砂 六錢 桑皮 三錢

白通草 一錢 煮成三盃分三次服

初九 腫未全消又發痰飲咳嗽表通則小便長右脈洪數譙照溢飲例與大青

龍法

生石膏 一兩 麻黃 三錢 細辛 一錢 桂枝 四錢 雲苓塊 五錢 連皮

姜半夏 五錢 杏仁 五錢 生薑 三錢 大棗 去核 炙甘草 三錢

煮成三盃分三次服

十一 咳減小便數而欠渴思涼飲鼻衄肺熱之故

生石膏 四兩 姜半夏 五錢 桂枝 五錢 杏仁泥 六錢 小枳實 三錢

雲苓皮 三錢 炙黃蘗 三錢 生薑 二片 炙甘草 三錢 大棗 去核 二枚

煮成三盃分三次服

日十三 腰以下腫已消腰以上腫尚重與治上焦法

茯苓皮 五錢 生薏仁 五錢 麻黃 去節 三錢 姜半夏 五錢 白茅根 三錢

生石膏 四兩 白通草 一錢 杏仁 五錢 蘆根 五錢 煮成三盃分三次服

日十五 腫減咳增脈洪數仍未止

杏仁泥 八錢 麻黃 蜜炙 三錢 生薏仁 三錢 旋覆花 三錢 包煎

生石膏 四錢 半夏 三錢 白茅根 三錢 白通草 一錢

飛滑石 六錢 蘆根 五錢 煮成三盃分三次服

日十七 咳雖減脈仍滑數腫未全消

生石膏 四兩 杏仁 六錢 苦葶 三錢 炒 飛滑石 六錢 海金砂 五錢

茯苓皮 三錢 半夏 五錢 蘇葉 三錢 連梗 煮成三盃分三次服

福 二十 初因愛飲冰振黃酒與冰振水果內溼不行又受外風從頭面腫起

不能臥晝夜坐被上頭大如斗六脈洪大先以越婢湯發汗腫漸消繼以

調理脾胃藥服至一百四十三帖而愈噁其戒豬肉黃酒水果伊雖不飲而冰振水果不能戒也一年後糞後便血如注與金匱黃土湯每劑黃土用一觔附子用八錢服至三十餘劑而血始止後與溫補脾陽至九十帖而始壯

范

十八歲 風水腫脹

生石膏 四兩 麻黃 去節 三錢 桂枝 三錢 杏仁泥 五錢
炙甘草 三錢 大棗 去核 二枚 煮成三盃分三次服

一帖而汗解頭面腫消次日與實脾利水五日全愈戒其避風伊不聽後八日復腫如故仍與前法而愈後受戒規故不再發

周

十八歲 腫從頭而起

麻黃 去節 生石膏 一兩 杏仁 五錢 桂枝 三錢 炙甘草 三錢 蒼朮 三錢
煮成三盃分三次服 如汗出不止以松花粉撲之 服一帖汗出不至足次日又服半

帖腫全消後以理脾收功

寒溼

乙丑六月 郭

三十歲 太陰中溼病勢沈悶最難速功非極剛以變脾胃兩陽不

可

姜半夏

六錢

桂枝

五錢

生茅朮

四錢

茯苓皮

五錢

椒目

三錢

小枳實

三錢

廣皮

三錢

生薏仁

五錢

生草果

三錢

生薑

一兩

老厚樸

四錢

煮成三碗分三次服

十九

寒溼為病誤用硝黃致瀉陰蟠踞堅凝如石苟非重剛何以直透重圍

川椒

炒黑

安邊桂

二錢

生薏仁

五錢

熟附子

五錢

猪苓

三錢

老厚樸

四錢

茯苓皮

五錢

澤瀉

三錢

乾姜

四錢

小茴香

三錢

生草果

二錢

白通草

二錢

廣皮

三錢

煮四碗分四次服

共服十三帖而後服轉

辛卯十月十八日 薛 二十歲 外痺寒溼太重內痰飲不食不寐咳嗽口渴大小便赤脈

數先開肺痺

生石膏

先煎代水一兩

桂枝

四錢

姜半夏

三錢

飛滑石

先煎六錢

生薏仁

三錢

杏仁泥

五錢

小枳實

三錢

茯苓皮

五錢

防己

五錢

橘皮

三錢

煮四盃日三夜一分四次服

二十 外痺痛而內痰飲內外俱痺

生石膏

先煎代水二兩

桂枝

三錢

海桐皮

三錢

飛滑石

六錢

杏仁

五錢

片姜黃

三錢

茯苓皮

五錢

穿山甲

三錢

姜半夏

五錢

地龍

三錢

生薏仁

三錢

白通草

一錢

橘皮

三錢

煮四盃分四次服二帖

廿二 痺痛腕重用藥以由經達絡爲要

生石膏

二兩

桂枝尖

三錢

防己

五錢

飛滑石

六錢

穿山甲

三錢

杏仁泥

五錢

片姜黃

三錢

地龍

三錢

茯苓皮

五錢

嫩桑枝

三錢

姜半夏 三錢 乳香 二錢 橘皮 二錢 煮四盃分四次服二帖

廿四 痺症先腿重而後腕重昨與通經活絡茲上下皆輕痛減能動脈亦漸小

脈小則病退也但加飲咳

生石膏 八錢 飛滑石 四錢 防己 五錢 蘇子霜 三錢 杏仁泥 五錢

姜半夏 六錢 穿山甲 三錢 炒地龍 三錢 晚蠶砂 三錢 雲苓皮 五錢

桂枝尖 三錢 桑枝尖 三錢 橘皮 三錢 煮四盃分四次服二帖

廿六 右寸猶大腿痛未除

生石膏 一兩 飛滑石 六錢 杏仁 六錢 海桐皮 三錢 雲苓皮 三錢

片姜黃 三錢 穿山甲 三錢 炒防己 六錢 晚蠶砂 三錢 姜半夏 三錢

桂枝尖 三錢 白通草 一錢 地龍 三錢 煮四盃分四次服二帖

廿八 右寸已小故右肢痛減左脈弦故左肢仍痛

杏仁泥 五錢 雲苓皮 五錢 獨活 一錢 防己 六錢 乳香 三錢

穿山甲三錢 炒桂枝尖五錢 沒藥三錢 地龍三錢 歸鬚三錢

片姜黃三錢 海桐皮三錢 煮四盃分四次服二帖

壬辰七月廿七日 毓氏二十歲 風寒溼三氣合而為痺脈弦又感燥金涼氣腹痛峻溫猶

恐不及尙可吃生冷猪肉介屬等陰物平

熟附子三錢 桂枝五錢 吳茱萸二錢 茯苓塊連皮六錢

生薑仁五錢 杏仁三錢 高良姜二錢 片姜黃二錢

川椒炭二錢 橘皮三錢 煮四盃分四次服二帖

廿九日 表裏俱痺肢痛板痛前用峻溫現在板痛少減仍遊走作痛兼有痰飲不

寐先與和裏

姜半夏八錢 桂枝五錢 吳茱萸三錢 小枳實三錢

茯苓塊連皮六錢 防己三錢 高良姜二錢 川椒炭三錢

橘皮三錢 煮三盃分三次服二帖

八月初二日 諸證已愈八九惟痺痛尙有斯須自覺胸中氣阻飽食反不阻矣宗氣

之虛可知議通補中焦

茯苓塊 六錢 桂枝 四錢 姜半夏 三錢 焦於朮 三錢

高麗參 二錢 杏仁 三錢 片姜黃 二錢 炙甘草 二錢

橘皮 三錢 煮三盃分三次服四帖

痺

初十日 五月 崑氏 二十 風溼相搏一身盡痛既以誤汗傷表又以誤下傷裏渴思

涼飲面赤苦絳得飲反停脇脹胸痛皆不知病因而妄治之累也議木防

己湯兩開表裏之痺

生石膏 一兩 桂枝 六錢 木防己 四錢 杏仁 四錢 生香附 三錢

炙甘草 三錢 蒼朮 五錢 煮三盃渣再煮一盃分四次服

十二日 脇脹止而胸痛未愈於前方內加薤白廣皮以清胸上之陽

吳氏醫案

寒溼 痺

薤白 三錢 廣皮 三錢

十四 痺症愈後胃不利土惡溼也

姜半夏 一兩 秫米 二合 生薑 三片 茯苓塊 五錢

水五碗煮取二碗渣再煮二碗分三次服

十六 痺後清陽不伸右脇痠痛

半夏 六錢 薤白 三錢 吳黃 一錢 桂枝 二錢 烏藥 二錢 青皮 一錢 廣皮 一錢 鬱金 二錢 煮取二盃渣再煮一盃分三次服

吳 十一 行痺

生石膏 五錢 桂枝 三錢 海桐皮 一錢 杏仁泥 三錢

生薤仁 三錢 防己 二錢 茯苓皮 二錢 片姜黃 一錢

炙甘草 一錢 牛膝 一錢 煮三盃分三次服

癸亥十一張 二十風溼 月十五日 五錢

羌活 三錢

苦桔梗 三錢

桂枝 二錢

半夏 二錢

蘇葉 三錢

杏仁泥 三錢

陳皮 二錢

生薑 二片

炙甘草 一錢

煮三盃分三次服

十六日 風溼相搏 一身盡痛 汗之不汗 用麻黃加朮法

麻黃

去節 五錢

杏仁 五錢

桂枝 三錢

炙甘草 三錢

羌活

一錢 五分

生薑 三片

煮三盃分三次服

晚 於前方內加

熟附子 三錢

半帖而愈

廿九日 乙酉四月 胡

十八歲

跗腫右脈洪數痰多咳嗽口渴莖中痛與涼利小便法

生石膏

八錢

滑石 六錢

海金砂 五錢

雲苓皮 五錢

生薏仁 五錢

甘草稍

一錢 五分

半夏 三錢

煮三盃分三次服四帖

五月初六日

脈之洪數者減去石膏二錢加

杏仁 三錢 廣皮 三錢

十二日

淫熱傷氣氣傷則短汗多必渴溼聚則跗腫與猪苓湯去阿膠加銀花以

吳氏醫案

癰

美

化溼熱化則諸證皆愈

飛僂石 六錢 猪苓 四錢 銀花 三錢 雲苓皮 五錢

澤瀉 三錢 煮三盃分三次服

二十日 溼熱不攘下注腿腫小便不利莖中痛

滑石 六錢 茯苓皮 五錢 萆薢 五錢 猪苓 三錢

薏仁 三錢 晚蠶砂 三錢 澤瀉 三錢 木通 二錢

甘草稍 一錢 煮三盃分三次服服至小便暢爲度

廿四日 脈洪數小便反黃加 黃柏滑石莖痛止去甘草稍

七月初四日 小便已長腫未全消脈弦滑咳嗽多痰

半夏 六錢 生薏仁 五錢 萆薢 五錢 猪苓 三錢 澤瀉 三錢

廣皮 四錢 茯苓皮 五錢 煮三盃分三次服

乙酉四月十九日 張二十歲 身熱頭痛腰痛肢痛無汗六脈弦細兩目不明食少寒溼

痺也

川烏頭 三錢

桂枝 五錢

防己 三錢

熟附子 三錢

生薏仁 五錢

杏仁 五錢

羌活 二錢

澤瀉 三錢

茯苓皮 五錢

廣皮 三錢

煮三盃分三次服

五月初三日

服前方二帖頭痛止旋即誤服他人補陰藥便溏腹脹今日復診因頭

痛愈用原方去羌活治藥逆加厚樸 三錢

初八日

痺症已愈頗能舉步便溏泄瀉皆止目已復明胃口較前加餐因多服一

帖脈稍數寒溼有化熱之象當與平藥逐其化熱之餘邪而已

飛滑石 六錢

杏仁 二錢

蠶砂 三錢

桑枝 五錢

茯苓皮 五錢

生薏仁 五錢

澤瀉 三錢

防己 二錢

煮三盃分三次服

六月十八日

又感受暑溼泄瀉脈弦腹脹與五苓法

桂枝 五錢

雲苓皮 五錢

生薏仁 五錢

猪苓 四錢

澤瀉 三錢

廣木香 二錢

炒蒼朮 三錢

廣皮 三錢

大腹皮 三錢

煮三盃分三次服

乙酉六月二十日

趙氏 四十歲

太陽寒痺脈弦背心板着而痛

茯苓皮

五錢

桂枝 五錢

川椒炭 三錢

生薏仁 五錢

川烏頭 三錢

白通草

一錢

防己 三錢

煮三盃分三次服

廿五日

服前藥已效而背痛難除加

附子 三錢

七月初二日

脈已回陽痛未止每日服半帖六日三帖加

晚蠶砂

四錢

木通 三錢

初九日

脈仍小陽未回背仍痛再服三帖分六日

乙酉五月初六日

趙

三十歲

痺症夾伏溼腹脹痛且有肥氣溼已化熱故六脈洪滑此

症本寒標熱先治其標本當在後

生石膏

四兩

桂枝 六錢

厚樸 五錢

防己 四錢

杏仁泥 六錢

姜半夏

五錢

廣皮 四錢

煮三盃分三次服四帖

初十日 復診尺脈洪數更甚加 雲苓皮 六錢 黃柏 三錢 木通 三錢

十一日 尺脈仍洪腹痛欲便後肛門熱痛原方再服二帖

十六日 水停心下漉漉有聲暫與逐水無暇治痺

半夏 六錢 枳實 六錢 生薑 五錢 廣皮 五錢

甘瀾水八盃煮成三盃分三次服

十九日 水嚕退腹脹甚仍服前方去黃柏加大腹皮

廿三日 痺少減胃悶不開其人本有肥氣肥氣成於肝鬱暫與兩和肝胃

半夏 六錢 雲苓塊 五錢 香附 三錢 益智仁 二錢 青皮 二錢

厚樸 三錢 降香末 三錢 廣皮 三錢 煮三盃分三次服

六月初三日 右脈大而數去蘇子厚樸青皮加 黃芩 二錢

初五日 諸症向安脈亦調適胃口亦開以調理脾胃立法

雲苓皮 五錢 半夏 五錢 白蔻仁 一錢 生薑仁 五錢

黃芩炭 二錢

廣皮 二錢

煮三盃分三次服

二十日誤食西瓜寒冷未有不發停飲者

雲苓塊 五錢

半夏 五錢

公丁香 八分

乾姜 三錢

小枳實 三錢

白蔻仁 一錢

廣皮 三錢

益智仁 一錢

五分

煮三盃分三次服

乙酉五月廿九日

錢氏 三十歲

寒痺脈弦短濇而緊由腿上連少腹痛不可忍甚至欲厥

兼有痰飲胃痛

桂枝 六錢

雲苓皮 五錢

小茴香 三錢

炒

川椒炭 三錢

防己 四錢

生薏仁 五錢

川烏頭 三錢

海桐皮 三錢

廣皮 三錢

片姜黃 三錢

煮三盃分三次服

六月初一日

左脈稍長仍然緊甚再服二帖

丸方寒溼為病

雲苓塊 八兩

炒蒼朮 六兩

熟附子 二兩

草薢 四兩

川椒炭 三兩

生薏仁 八兩

小茴香 四兩

炒

川棟子 三兩

木通 四兩

其爲細末神麴爲丸如小梧子大每服三錢姜湯下

乙酉正月
初七日

楊氏二十
六歲

前曾崩帶後得癱痺病者自疑虛損詢病情寒時輕熱時

重正所謂經熱則痺絡熱則痿者也再行經有紫有黑經來時不維腰腿

大痛少腹亦痛經亦不調或多或寡日數亦然此中不但溼熱且有瘀血

治溼熱用湯藥治瘀血用丸藥

左脈浮取弦而沈取寬
泛右脈浮取弦沈取洪

湯藥用諸痺獨取

太陰法丸藥用化癥回生丹

生石膏

二兩

桂枝

四錢

海桐皮

三錢

杏仁泥

五錢

生薏仁

五錢

防己

四錢

晚蠶砂

三錢

雲苓皮

五錢

白通草

一錢

煮三盃分三次服

乙酉

月

十四

日

六歲

暑溼痺症誤以熱地等柔藥滑脾致令泄瀉卧牀不起兩足

蹇曲不伸飲食少進兼之疝痛先以五苓加川椒廣皮木香止其瀉繼以

半夏廣皮良姜益智白蔻開其胃復以丁香川椒吳萸雲苓薏仁姜黃平

王

其疝又以防己杏仁桂枝烏頭薏仁雲苓皮川椒等伸其痺末惟引痛風在筋也重用地龍桂枝引痛亦止後以補脾胃而全愈

四十歲寒溼爲痺背痛不能轉側晝夜不寐二十餘日兩腿拘攣手不能抬口眼歪斜煩躁不寧畏風自汗脈弦舌苔白滑面色昏暗且黃睛黃大便秘閉先以桂枝杏仁薏仁羌活廣皮半夏茯苓防己川椒滑石令得寐繼以前方去川椒羌活加白通草燼砂萆薢得大便一連七八日均如黑彈子服至二十餘劑身半以上稍鬆背足痛甚於前方去半夏加附子片子姜黃地龍海桐皮又服十數帖痛漸止又去附子地龍又服十數帖足漸伸後用二妙丸加雲苓薏仁萆薢白朮等藥收功

何

六十歲手足拘攣誤服桂附人參熟地等補陽以致面赤脈洪數小便閉身重不能轉側手不能上至鬢足蹠曲絲毫不能轉側移動細詢病情因大飲食肉而然所謂溼熱不攘大筋輭短小筋弛長輭短爲拘弛長爲痿者

也與極苦通小腸淡滲利膀胱

生石膏 八兩 防己 五錢 胡黃連 三錢 扶苓皮 六錢 晚蠶砂 四錢

飛滑石 一兩 杏仁 三錢 龍膽草 四錢 穿山甲 三錢 白通草 二錢

洋蘆薈 三錢 桑枝 五錢 地龍 三錢 煮三碗分三次服

前方服至七日後小便紅黑而濁臭不可當半月後手漸動足漸伸一月後下牀扶椅桌能行四十日後走至簷前不能下階又半月始下階三月後能行四十步後因痰飲用理脾肺收功此症始於三月廿三日
至八月廿三日停藥

周

四十兩腿紫絳而腫上起小細瘡如癩已三年矣兩腿膝痠痛不能立六歲二歲兩腿紫絳而腫上起小細瘡如癩已三年矣兩腿膝痠痛不能立六歲

版弦細而緊實氏扁鵲心書謂之蘇木腿蓋寒溼着痺也
附子 八兩 雲苓皮 一兩 桂枝 一兩 生薏仁 一兩 烏頭 六錢

煮四盃分四次服服至三十餘帖而始策杖能行後去烏附用通經活

絡滲溼而愈

成

五十歲腰間痠軟兩腿無力不能跪拜間有腰痛六脈洪大而滑前醫無非補陰故日重一日此溼熱痿也與諸痿獨取陽明法

生石膏 四兩 杏仁 四錢 晚蠶砂 三錢 防己 四錢 海桐皮 二錢

飛滑石 一兩 萆薢 五錢 生薏仁 八錢 桑枝 五錢 雲苓皮 五錢

白通草 二錢 煮三碗分三次服其服九十餘帖病重時自加石膏一

倍後用二妙散收功

乙酉正月十五日 趙 四十歲肝鬱挾痰飲腎水上凌心心悸短氣腹脹胸痹六脈反沈

洪水極而似火也與蠲飲伐腎邪兼降肝逆法

雲苓皮 一兩 桂枝 五錢 蘇子霜 三錢 小枳實 五錢 川椒炭 三錢

姜半夏 八錢 降香 三錢 旋覆花 三錢 包煎生薑汁 每盃沖三匙 廣皮 四錢

甘瀾水煮四盃分早中晚夜四次服四帖戒生冷豬肉鹹菜

二十 痰飲兼痺腎水上凌心驚悸短氣腰脊背痛皆太陽所過之地小便短而

腹脹肚臍突出是內而臟腑外而肌肉無不痺者且與開太陽之痺脈洪

大與大青龍合木防己湯法

生石膏 四兩 杏仁 四錢 厚樸 三錢 雲苓皮 六錢 防己 四錢

飛滑石 六錢 桂枝 五錢 半夏 五錢 生薏仁 五錢 廣皮 三錢

小枳實 五錢 通草 一錢 煮四孟分四次服

廿一 於前方內加 飛滑石 四錢 晚蠶砂 三錢

廿二 外而經絡之痺內而臟腑之痺行痰開痺俱不甚應現在脈洪大小腹脹

小便短而臭濁先與開支河使溼熱得有出路再商後法

飛滑石 一兩 海金砂 五錢 猪苓 四錢 雲苓皮 五錢 白通草 一錢

小茴香 三錢 川萆薢 五錢 澤瀉 三錢 煮三孟分三次服二帖

廿五 加去陳莖法 兩頭尖 三錢 半夏 五錢 三帖

廿九 瘕症夾痰飲六脈洪數溼已化熱屢利小便不應非重用石膏宣肺熱不

可諸瘕獨取太陰也

生石膏 四兩 桂枝 五錢 生薏仁 五錢 防己 五錢 晚蠶砂 三錢

飛滑石 二兩 杏仁 五錢 雲苓皮 五錢 黃柏 四錢 白通草 一錢五分

羌活 一錢 煮四孟分四次服四帖

二月初四日 瘕症十年誤補三年以致層層固結開之非易石膏用至二觔有餘服

象方小其半現在少腹脹甚而小便不暢腰痛胸痛邪無出路必得小便暢行方有轉機

生石膏 四兩 桂枝 六錢 杏仁泥 六錢 老厚樸 五錢

飛滑石 四兩 防己 五錢 小茴香 炒炭 三錢 小枳實 五錢

雲苓皮 一兩 木通 六錢 煮四孟分四次服

以後脈大而小便不利用此小便利者去滑石

初五 大用石膏六脈已小經謂脈小則病退蓋脈爲病之帥脈退不怕病不退

經又謂脈病人不病者死人病脈不病者生現在病歸下焦血分其人本有肝鬱兼通下焦血分

雲苓皮 一兩 桂枝 六錢 小枳實 五錢 防己 六錢 小茴香 六錢 炒炭

海桐皮 三錢 木通 四錢 炒黃柏 三錢 廣皮 三錢 川椒炭 二錢

全當歸 三錢 煮三盃分三次服

初六 加 石膏 三兩 滑石 一兩

初七 加 厚樸 三錢 姜半夏 五錢

蜣螂丸方 痺症夾痰飲疝瘕六脈洪大用諸痺獨取太陰法脈洪大之極者

已小難經所謂人病脈不病者生但脈雖平而痕脹痺痛未除議以烏藥散退痕痺之所以難退者以久病在絡故也再以緩通肝絡法脈苦復大仍服前方數帖見效卽止

蟻螂蟲 一兩

降香 三兩

小茴香 三兩

穿山甲 三兩

片姜黃 三兩

歸鬚 四兩

川棟子 三兩

兩頭尖 二兩

海桐皮 三兩

口射 三兩

滴乳香 一兩

地龍 去泥 二兩

其爲細末酒水各半爲丸每服二錢日二三次從此服蟻螂丸起兩月而止

三月廿四日

痺症夾痰飲脈本洪數前用辛涼脈減兼用通絡散瘕丸散亦效現在六脈中部仍洪但不數耳議暫用宣肺

生石膏

四兩

桂枝 八錢

半夏 八錢

杏仁 八錢

雲苓塊 一兩

飛滑石

二兩

防己 六錢

全歸 三錢

廣皮 三錢

小枳實 四錢

海桐皮

三錢

煮四盃分四次服

廿六日

復診右脈更大小便反短用苦辛淡法於前方內加

黃柏 三錢

四月十六日

痺痛夾痰飲

生石膏 八錢 桂枝 五錢 生薏仁 五錢 雲苓皮 五錢

晚蠶砂 三錢 防己 四錢 杏仁泥 五錢 姜半夏 五錢

白通草 一錢 廣皮 三錢 煮三盃分三次服

十七 內而脇痛外而腰背痺是氣血兼痺也

桂枝尖 五錢 雲苓皮 三錢 防己 三錢 杏仁泥 五錢 旋覆花 三錢 包煎

生薏仁 三錢 廣鬱金 二錢 半夏 四錢 小枳實 四錢 片姜黃 二錢

白薏仁 一錢 歸鬚 二錢 廣皮 三錢 煮三盃分三次服

廿五 痰飲踞於中焦痺痛結於太陽氣上沖胸二便不利

雲苓塊 一兩 桂枝 八錢 小枳實 六錢 飛滑石 六錢

姜半夏 五錢 防己 六錢 杏仁泥 八錢 白通草 一錢

廣皮 三錢 煮三盃分三次服

五月初三日 大凡腹脹之疾不責之太陰卽責之厥陰此症自正月以來開太陽之

藥末有不泄太陰者他症雖減其半而腹脹不除其故有三一者病起肝鬱二者肝主疏泄誤補致壅三者自正月以來以右脈洪大之故痺症雖重治在肺經經有諸痺獨取太陰之明訓茲右脈平而左脈大不得着於前議暫與泄厥陰之絡久病在絡故也

半夏

五錢

旋覆花

五錢

黃芩

三錢

蘇子霜

三錢

歸鬚

三錢

厚樸

五錢

小枳實

五錢

降香

三錢

晚蠶砂

三錢

廣皮

三錢

杉皮

三錢

廣鬱金

三錢

煮三盃分三次服

廿三日

左脇痛脹卧不着席胸亦悶脹氣短肝脈絡胸之故

旋覆花

三錢

歸鬚

三錢

半夏

五錢

廣鬱金

三錢

廣皮

三錢

新絳紗

三錢

蘇子霜

三錢

香附

四錢

小枳實

四錢

青皮

三錢

川椒炭

四錢

降香末

三錢

煮三盃分三次服七帖

六月初一日

痰飲肝鬱脈弦細氣上沖胸

旋覆花四錢包煎 蘇子霜 三錢 半夏 六錢 降香末 三錢 小枳實 三錢
廣鬱金 三錢 桂枝尖 三錢 廣皮 五錢 公丁香 二錢 片姜黃 三錢
小青皮 三錢 煮三盃分三次服

初三日痰飲上泛咳嗽稀痰兼發痺症

桂枝 六錢 雲苓皮 五錢 川烏 三錢 小枳實 四錢 防己 六錢
杏仁 五錢 飛滑石 四錢 薏仁 三錢 炒黃柏 三錢 桂心 二錢
廣皮 五錢 白通草 二錢 煮三盃分三次服

初六日小便不暢下焦溼聚於原方複滋腎九法

十一日痺症未盡除痰飲未全消當盛暑流行之際逐飲開痺即所以防暑

半夏 六錢 雲苓塊 六錢 防己 三錢 生薏仁 六錢 桂枝 三錢
杏仁 三錢 小枳實 二錢 廣皮 二錢 煮三盃分三次服

十三日暑泄腹脹舌黃其人本有痰飲痺症議五苓去朮加 滑石厚樸杉皮木

香半夏藿香廣皮

桂枝 三錢 雲苓皮 五錢 木香 一錢五分 飛滑石 六錢 猪苓 四錢

澤瀉 四錢 白薏仁 三錢 厚樸 三錢 藿香梗 三錢 山連 一錢

半夏 三錢 川椒炭 二錢 杉皮 三錢 煮三盃分三次服

日十五 脈緩

日十六 脈緩甚俱服前方

日廿二 久病在絡其本病統俟丸藥立方但逐痰飲宣氣化捍時令之暑溼而已

半夏 六錢 雲苓塊 五錢 厚樸 二錢 小枳實 三錢 香附 三錢

杉皮 三錢 大腹皮 三錢 廣皮 三錢 煮三盃分三次服

日廿六 服化癥回生丹起每日一九

日廿七 脈浮筋骨痠痛氣短五心煩熱新感暑溼之氣加以辛涼與宣三焦

銀花 三錢 小枳實 三錢 杏仁 三錢 藿香葉 三錢 連翹 三錢

廣皮 三錢 白蔻仁 二錢 薏仁 五錢 煮三盃分三次服

七月初二日 背痛甚先與通太陽之痺

桂枝 六錢 雲苓皮 八錢 小枳實 五錢 打碎 杏仁泥 三錢 防己 五錢

半夏 五錢 川椒炭 二錢 煮三盃分三次服亥初令完

初九日 近日陰雨連綿背痛腹脹不減兩便不爽非嘔則噦與宣痺開鬱兼去陳

莖

杏仁泥 六錢 桂枝 六錢 雲苓皮 半皮半塊 二兩 防己 六錢 小枳實 五錢

公丁香 三錢 厚樸 五錢 晚蠶砂 三錢 白蔻仁 三錢 兩頭尖 三錢

小茴香 三錢 煮四盃分四次服

日廿一 寒溼發痺脈緩甚中有痰飲

茯苓 連皮 八錢 生薏仁 四錢 枳實 三錢 熟附子 二錢 防己 五錢

桂枝 八錢 片姜黃 三錢 薤白 三錢 川萆薢 五錢 杏仁 四錢

川烏二錢 白通一錢五分 廣皮五錢

煮四盃分四次服

廿八日 脈弦緊痰飲痺症癥瘕因燥氣而發臟腑經絡俱痺故肢冷而畏寒也峻

與通陽

桂枝一兩 小枳實四錢 杏仁五錢 公丁香三錢 澤瀉三錢

川椒五錢 片姜黃三錢 半夏五錢 穿山甲一錢 防己五錢

歸鬚二錢 廣皮六錢 煮四盃分四次服

自六月廿六日起每日空心服化癥回生丹一九七月廿九日以後每日服天台烏藥散三分五分一錢二錢不等至十月十二日每兩烏藥散中加巴霜一分每晚服三分五分不等間有服至一錢十一月初一日以後每晚間服通補奇經丸

十二月 痺痛飲咳脈弦細 初十日

雲苓皮六錢

桂枝八錢

生薏仁五錢

川萆薢五錢

飛滑石 四錢
防己 五錢
小枳實 三錢
川椒炭 三錢

川烏頭 三錢
杏仁 四錢
煮四盃分四次服

日十二 衝氣止動畏寒脈沈細與桂枝加桂湯法直伐衝氣

桂枝尖 一兩
二錢
紫石英 六錢
小茴香 五錢
炒
猪桂心 八錢

雲苓塊 三錢
煮四盃分四次服

日十三 大寒節衝氣未止脈反弦緊於原方內加 當歸 五錢
川芎 三錢

服二帖脈中陽氣生動衝氣平畏寒止仍然早服化癥回生丹一九晚

服通補奇經丸三錢

戊子十一月初十日 宋女 十六歲 六脈弦緊面色青白寒痺攻胃嘔吐不能食足痠痛不能

行誤與陰虛門中之陰柔以助其陰又大用苦寒堅陰重傷胃陽無怪日

重一日也先與和胃令能食再商治痺

姜半夏 六錢
生薏仁 六錢
生薑片 三大
雲苓塊 六錢

吳氏醫案

痺

三

川椒炭 三錢

甘瀾水入盃煮取三盃分三次服

六脈俱弦而緊經謂脈雙弦者寒也又謂緊則爲寒面色青黃是色脈皆陰也症現兩腿足痠痛不能履步跪拜按陽明主前不能前者陽明傷也太陽主却不能却者太陽傷也足太陽陽明兩經爲風寒溼三邪之干而成痺更可知矣痛甚則氣上沖心嘔不能食按諸上升之氣皆自肝而來姑娘年輕失母肝鬱多端肝木病則克胃土挾寒上升能不嘔乎金匱謂腳氣攻心發作欲死者是也再按腳氣卽痺症之一端溼燥寒三者爲陰陰邪此乃陰邪太實之症醫法自當以通經達絡和胃開鬱爲要無奈不識陰陽不分寒熱不知虛實一以補陰寒涼純陰之品誤助病邪甚有以大黃芒硝混下者病家以得二便通利則病勢少減故屢用之以致胃氣傷殘日重一日矣其大便通而病少減之故蓋肝主疎泄肝病則不得疎泄又痺者閉也初病在絡經誤治成久病延及臟腑矣卽用通大便法亦

當溫下不當用寒下既助寒溼之邪又重傷胃陽繼傷腎陰精神血氣無一不傷從茲以往尚有生理乎經云勞者溫之未聞勞者寒之也又云得穀者昌又云有胃氣者生無胃氣死治此症第一義急救胃氣爲要胃氣和而得食得寐再商治痺如居家者然萬事從緩先安爐竈也

日十二 脈弦細而緊寒溼上攻嘔吐不食與和胃止嘔稍能進食仍宗前法小便

短兼開太陽

姜半夏 六錢

葶藶 五錢

益母仁 二錢

生薑汁 三匙

雲苓皮 六錢

香附 三錢

煮三盃分三次服

日十五 寒痺六脈弦緊不食而嘔便短純陰沍寒之疾與闔陽明嘔止得進食與

開太陽便稍通前方單救陽明次方兼醒脾陽將來治痺且須峻補腎中

眞陽而世人以予藥爲熱不可服不知頭等陽藥如烏附之類尙未服也

姜半夏 六錢

雲苓 半塊半

雞內金 三錢

生薑仁 六錢

益智仁 二錢

香附 三錢

川萆薢 四錢

白通草 一錢

白蔻仁 三錢

廣皮 二錢

煮三益分三次服

十七日

誤傷胃陽不食而嘔自以復陽明之陽為主卽以十七歲不月而論經謂

二陽之病發心脾女子不月此病亦當以通補陽明立法再陽明主約束筋骨而利機關經謂諸痿獨取陽明痿痺更以通補陽明爲要又謂虛則補其母陽明陽土也其母火也補火焉能不用熱藥哉

姜半夏 五錢

萆薢 三錢

川椒炭 一錢五分

生薏仁 三錢

雲苓塊 五錢

香附 三錢

益智仁 一錢五分

廣皮炭 三錢

生薑 三錢

煮三益分三次服

己丑十一月初九日

魯氏 三十歲

太陽痺腰腿痛甚脈弦遲與溫通經絡

雲苓皮 五錢

桂枝 五錢

片姜黃 三錢

生薏仁 五錢

海桐皮 三錢

羌活 一錢

木防己 三錢

公丁香 一錢

乳香 一錢

煮三盃分三次服服一帖去羗活再服一帖

十二 太陽痺腰腿痛甚因風寒而起脈弦遲與溫通經絡茲風已化熱右脈洪

大痛未止議用經熱則痺例

生石膏

二兩

桂枝

六錢

小茴香

炒三錢

雲苓皮

六錢

杏仁泥

五錢

生薏仁

六錢

防己

六錢

片姜黃

三錢

煮三盃分三次服

十七

太陽痺與經熱則痺例已效仍宗前法加利小便使邪有出路

生石膏

二兩

桂枝

六錢

生薏仁

六錢

飛滑石

四錢

晚蠶砂

三錢

雲苓皮

六錢

防己

六錢

杏仁泥

五錢

小茴香

炒三錢

川萆薢

三錢

煮四盃分日三夜一四次服

痰飲

壬戌八月

張氏

四十歲

內而伏飲外而新涼內外相搏痰飲斯發

姜半夏

五錢

杏仁粉

三錢

厚樸

三錢

飛滑石

三錢

小枳實

二錢

生薏仁 五錢 桂枝木 三錢 廣皮 二錢 茯苓皮 三錢 白通草 三錢

生薑 三片 煮三盃分三次服

廿八 支飲射肺眩冒小青龍去麻辛

焦於朮 三錢 桂枝 四錢 生薏仁 五錢 半夏 六錢 小枳實 二錢

杏仁粉 五錢 乾姜 二錢 製五味 一錢 生薑 三片 炙甘草 二錢

炒白芍 三錢 煮三盃分三次服

九月初一日 渴爲痰飲欲去不寐爲胃仍未和故以枳實橘皮湯逐不盡之痰飲以

半夏湯和胃令得寐

半夏 一兩 生薏仁 五錢 秫米 一合 小枳實 二錢 打碎

桂枝 三錢 杏仁粉 三錢 廣皮 三錢 生薑 三片

煮三盃分三次服得寐再診

初六日 服半夏湯既得寐矣而反更咳痰多議桂枝乾姜五味茯苓湯合葶藶大

桑瀉肺湯逐飲

半夏 五錢

茯苓塊 六錢

苦葶藶子 三錢

炒黃

乾姜 五錢

桂枝 五錢

五味子 三錢

肥大棗肉 四錢

甘瀾水五碗煮取二碗分二次服渣再煮一碗服

初八日先以葶藶大棗瀉肺湯行藥已攻動之飲令其速去

苦葶藶 四錢

肥大棗 五枚

水五盃煮取八分二盃分二次服

又服葶藶大棗湯後即以半夏湯和胃

半夏 一兩

小枳實 四錢

生薑 五片

洋參 二錢生薑甘塊同搗

水八盃煮取三盃分三次服

九月初十日遂去水後用外臺茯苓飲消痰氣令能食

炒於朮 六錢

茯苓塊 六錢

廣皮 三錢

半夏 三錢

小枳實 四錢

生薑 八錢

洋參 二錢姜汁製黃色

煮三盃分三次服

日十五 飲歸腸下則肝病肝病則脾氣愈衰故得後與氣則快先與行脇下之飲

泄肝即所以舒脾俟脇痛止再議補脾

生香附 三錢 半夏 四錢 蘇子霜 三錢 廣皮 二錢 旋覆花 三錢 包煎

小枳實 一錢 青皮 一錢 降香末 三錢 煮三盃分三次服

日二十 行脇絡之飲業已見效倘有不盡仍用前法

生香附 三錢 半夏 二錢 廣鬱金 二錢 旋覆花 三錢 包煎

蘇子霜 一錢 降香末 一錢 廣皮 一錢

小枳實 一錢 煮三盃分三次服

日廿二 通補中陽兼行脇下不盡之飲

代赭石 五錢 半夏 五錢 焦白朮 三錢 桂枝 三錢 旋覆花 三錢 包煎

茯苓塊 五錢 生薑 三片 炙甘草 三錢 煮三盃分三次服

十月初二日 通降脇下之痰飲兼與兩利肝胃

半夏 六錢 旋覆花 三錢 廣皮 二錢 桂枝尖 二錢 小枳實 二錢 打碎

乾姜 一錢 蘇子霜 三錢 生薑 三片 煮三盃分三次服

癸亥二月 金氏 六歲 風寒夾痰飲為病自汗惡風喘滿短氣渴不多飲飲則嘔

夜咳甚倚息不得卧小青龍去麻辛加枳實廣皮行飲而降氣

桂枝 六錢 茯苓塊 六錢 廣皮 二錢 小枳實 二錢 炒白芍 三錢

半夏 六錢 炙甘草 三錢 乾姜 三錢 製五味 一錢 生薑 三片

甘潤水八盃煮取三盃分三次服

十一 昨用小青龍咳雖稍減仍不得寐今日用葶藶大棗合法

桂枝 八錢 半夏 六錢 小枳實 二錢 苦葶藶 三錢 炒香 炙甘草 三錢

炒白芍 四錢 乾姜 五錢 五味子 一錢 大棗肉 五錢 廣皮 三錢

水八盃煮取三盃分三次服渣再煮一盃服

十二 用小青龍逐飲兼利小便使水有出路

杏仁泥 五錢 桂枝 五錢 小枳實 二錢 乾姜 二錢 炒白芍 二錢

生薑仁 五錢 半夏 五錢 白通草 一錢 生薑 三片 製五味 一錢

炙甘草 一錢 煮成兩盃分二次服渣再煮一盃服

十三 脈稍平病起本渴大服薑桂湯反止者飲居心下格拒心火之渴也仍以

蠲飲爲主微惡寒兼和營衛

茯苓塊 三錢 桂枝 六錢 小枳實 一錢 炒白芍 三錢 大棗肉 二錢

杏仁泥 四錢 半夏 六錢 炙甘草 一錢 廣陳皮 一錢 製五味 一錢

乾姜 三錢 生薑 三錢 煮成兩盃分二次服渣再煮一盃服

十四 咳則脇痛不惟支飲射肺且有懸飲內痛之虞兼逐脇下懸飲

姜半夏 八錢 桂枝 六錢 蘇子霜 二錢 旋覆花 三錢

杏仁泥 四錢 乾姜 四錢 小枳實 二錢 廣陳皮 二錢

廣鬱金 三錢 青皮 二錢 生香附 三錢 製五味 一錢

生薑 五錢

煮三碗分三次服渣再煮一椀服

日十五

咳止大半惟脇痛攻胸肝胃不和之故切戒惱怒用通肝絡法

姜半夏

六錢

桂枝尖

三錢

乾姜

三錢

廣鬱金

三錢

旋覆花

三錢

蘇子霜 三錢

降香末

三錢

歸鬚

二錢

生香附

二錢

青皮

二錢

頭煎兩盃二煎一盃分三次服

癸亥二月廿二日

謝氏二十歲

痰飲哮喘咳嗽聲重有汗六脈弦細有七月之孕與小青

龍去麻辛主之

桂枝 五錢

小枳實

二錢

乾姜

三錢

炙甘草

一錢

半夏 五錢

五味子

一錢

廣皮

一錢

白芍

三錢

甘瀾水五盃煮取二盃分二次服渣再煮一盃服

日廿三

其人本渴服桂枝乾姜熱藥當更渴今渴反止者飲也惡寒未罷仍用小

青龍法胸痺痛加薤白按飲爲陰邪以誤服苦寒堅陰不能速愈

桂枝 八錢 小枳實 二錢 半夏 六錢 炒白芍 四錢 薤白 三錢

乾姜 五錢 製五味 一錢 厚樸 三錢 炙甘草 二錢 廣皮 二錢

甘瀾水五盞煮取二盞渣再煮二盞分四次服

日廿四 胃不和則卧不安亥子屬水故更重脹也痛也皆陰病也無非受苦寒藥

之累

姜半夏 八錢 桂枝 八錢 杏仁泥 三錢 炒白芍 三錢

茯苓塊 五錢 乾姜 五錢 五味子 一錢 苦桔梗 三錢

生薏仁 五錢 厚樸 三錢 炙甘草 一錢 薤白 三錢

甘瀾水八碗煮取三碗分三次服渣再煮一碗服

日廿五 寒飲誤服苦寒堅陰大用辛溫三帖今日甫能轉熱右脈始大左仍弦細

咳嗽反重者是溫藥啟其封閉也再以溫藥兼活痰痰出自然慙快

桂枝 五錢 杏仁泥 三錢 厚樸 三錢 小枳實 二錢 半夏 八錢

茯苓 五錢 炒白芍 三錢 薤白 三錢 製五味 一錢 乾姜 三錢

薏仁 五錢 括葉 二錢 煎法服法如前

廿六 右脈已退病勢稍減但寒熱汗多胸痺恐成渴汗則陽愈虛飲更難愈議

桂枝加附子去甘草以助脹故也合括葉薤白湯意通中上之清陽護表

陽爲急

桂枝木 六錢 厚樸 二錢 小枳實 一錢 炒白芍 四錢

熟附子 二錢 薤白 三錢 大棗肉 二枚 生薑 三片

甘瀾水五盃煮取兩盃渣再煮一盃分三次服其第一盃服後卽嘔稀

熱粥半碗令微汗佳其二三不必嘔粥

廿七 昨日用桂枝湯加附子再加薤白法漏汗已止表之寒熱已和但咳甚議

與逐飲

桂枝 六錢 姜半夏 五錢 葶藶 炒研細 茯苓 六錢 生薏仁 五錢

大棗肉 五枚

甘瀾水入盃煮取三盃分三次服

僧

四十歲脈雙弦而緊寒也不欲飲水寒飲也喉中癢病從外感來也痰清不粘亦寒飲也咳而嘔胃陽衰而寒飲乘之謂之胃咳也背惡寒時欲厚衣向火衛外之陽虛而寒欲乘太陽經也面色淡黃微青唇色淡白亦寒也法當溫中陽而護表陽未便以吐血之後而用柔潤寒涼小青龍去麻辛加枳實麝皮杏仁生薑湯主之用此方十數帖而愈

癸亥二月 初十日 徐氏 二十歲 酒客脈弦細而沉喘滿短氣脇連腰痛有汗舌白滑而厚

惡風寒倚息不得卧此係裏水招外風為病小青龍去麻辛證也

姜半夏 六錢

桂枝 六錢

炒白芍 四錢

旋覆花 三錢 包煎

杏仁泥 五錢

乾姜 三錢

製五味 一錢 五分

炙甘草 一錢

生姜 五片

煮三盃分三次服

癸亥七月 廿三日 邵 二十歲 右關單弦飲癖少陰獨盛水臌盛而土氣衰已至吞酸飯

後吐痰不止治在胃腎兩關不能戒酒不必服藥用真武湯法

熟附子 五錢 真山連 同吳茱萸浸炒一錢五分 細辛 一錢 茯苓塊 六錢 生薑 五片

吳茱萸 三錢 生薑 六錢 水八盃煮三盃分三次服四帖

廿八日 內飲用溫水臟法已見大效但藥太陽剛不可再用所謂一張一弛文武之道且議理陽明以為過峽文字

姜半夏 六錢 小枳實 一錢 廣皮 一錢 茯苓塊 六錢 白豆蔻 一錢

生薑 六錢 生薑 六錢 煮三盃分三次服四帖

八月初三日 用理陽明亦復見效惟吐酸仍然未止按吞酸究屬肝病議肝胃同治

法

半夏 六錢 茯苓 三錢 青皮 一錢 桂枝 三錢 吳茱萸 三錢 生薑 二片

薏仁 五錢 山連 二錢 煮三盃分三次服四帖

某氏 內飲招外風為病既喘且咳議小青龍法

桂枝 三錢

茯苓塊 二錢

炒白芍 一錢五分

乾姜 三錢

麻黃 一錢

製五味 一錢

生薑仁 五錢

細辛 八分

半夏 三錢

炙甘草 一錢五分

煮三盃分三次服

又痰飲喘咳前用小青龍業已見效但非常服之品服遲緩議外飲治脾法

茯苓塊 六錢

桂枝 五錢

生於朮 三錢

益智仁 一錢五分

製茅朮 四錢

半夏 六錢

生薑仁 五錢

炙甘草 二錢

生姜 五片

煮三盃分三次服四帖

甲子十月廿八日 皮氏八歲 痰飲喘咳左脈浮弦沈緊自汗勢甚凶危議小青龍去麻

辛加厚樸杏仁

桂枝 六錢

杏仁霜 五錢

厚樸 三錢

製五味 二錢

半夏 六錢

炙甘草 三錢

乾姜 五錢

炒白芍 四錢

甘瀾水八盃煮取三盃分三次服

廿九 於前方內加 雲苓塊 五錢 半夏 五錢

三十 服小青龍已效然其水尚洋溢未能一時平復

桂枝 八錢 杏仁霜 五錢 乾姜 五錢 五味子 三錢 雲苓 八錢

半夏 一兩 炒白芍 五錢 廣皮 三錢 炙甘草 三錢 生姜 五片

甘瀾水煮成四碗分四次服

十一月初二日 以眩冒甚於前方內加 於朮 六錢

初四日 脈現單弦喘止咳減眩冒未盡再太陰屬土既重且緩萬不能一時速愈

且痰飲多年豈三五日可了

於朮 六錢 杏仁霜 五錢 桂枝 五錢 五味子 六錢

半夏 一兩 炙甘草 三錢 乾姜 三錢 雲苓 六錢

甘瀾水八碗煮取三碗分三次服三帖

乙丑二月初三日 福 三十 痰飲胸痺兼有脇下懸飲

吳氏醫案 痰飲

四

旋覆花

三錢 包煎

桂枝

三錢

厚樸

一錢

薤白

二錢

小枳實

三錢

杏仁泥

三錢

半夏

五錢

括萎

一錢

廣皮

一錢五分

生香附

三錢

水八碗煮取三碗分三次服三帖

初七日

胸痺懸飲已愈惟腸痺食不甘味議和肝胃兼開腸痺

生薏仁

五錢

半夏

三錢

廣皮

二錢

白通草

二錢

小枳實

二錢

杏仁

八錢

姜汁

三匙

水五盃煮取二盃渣再煮一盃分三次服

乙丑十一月十一日

李

三十歲脈弦細而沉咳嗽倚息不得卧胸滿口渴用小青龍去麻

辛法

桂枝

六錢

小枳實

七錢

白芍

四錢

乾姜

五錢

半夏

一兩五錢

五味子

二錢

茯苓

一兩

廣皮

三錢

炙甘草

三錢

煮四碗分四次服

十三服小青龍已效但喉啞知渴脈見微數爲痰飲欲去轉用辛涼開提肺氣

法

蜜麻黃 三錢 石膏 八錢 杏仁 五錢 半夏 三錢 苦桔梗 二錢

生甘草 三錢 廣皮 一錢 煮三盃分三次服

丙寅正月十四日 煥氏 三十歲 痰飲法當惡水反喜水者飲在肺也喜水法當用甘潤今

反溫燥以其爲飲也既喜水曷以知其爲飲以得水不行心悸短氣喘滿眩冒咳嗽多痰嘔惡諸飲證畢具也既爲飲證何以反喜水以水停心下格拒心火不得下通於腎反來上燦華蓋反格拒腎中真水不得上潮於喉故啞乾而喜水以救之也是之謂反燥反燥者用辛能潤法

半夏 一兩 小枳實 八錢 雲苓塊 一兩 杏仁泥 六錢 廣皮 五錢

生薑 一兩 甘瀾水八碗煮取三碗渣再煮一碗分四次服

丙寅正月十四日 顏 四十歲 嗽不欲飲倚息不得卧脇痛自汗不寐脈弦緩議小青龍

吳氏醫案

痰飲

巽

去麻辛加 杏仁薏仁再重加半夏

杏仁泥 六錢 桂枝 六錢 五味子 一錢五分 焦白芍 三錢

生薏仁 一兩 半夏 一兩 炙甘草 一錢五分 乾姜 三錢

甘瀾水入碗煮取三碗分三次服

廿七日 嘔涼水於前方內加 乾姜 二錢 廣皮 三錢 以消痰氣

二月初一日 金匱謂桂枝乾姜為熱藥服之當遂渴今反不渴者飲也茲證不惟不

渴反嘔涼水不止其為寒飲無疑既真知其為飲雖重用姜桂何懼乎世人之不能立方者皆未真知病情也畏而不敢服者亦未真知病情也

桂枝 八錢 小枳實 二錢 乾姜 七錢 焦白芍 四錢 茯苓 連皮四錢

半夏 二兩 五味子 一錢五分 廣皮 三錢 炙甘草 二錢 生姜 五片

甘瀾水入盃煮取三盃渣再煮一盃分四次服

丙寅正月 廿六日 崑 四十 飲家眩冒用白朮澤瀉湯法脈洪滑而沈

半夏一兩 茯苓塊一兩 澤瀉二兩 白朮一兩 小枳實三錢

甘瀾水八碗煮取三碗渣再煮一碗分四次服

廿七日 於前方內加 竹茹六錢 生薑汁每盃沖三小匙

二月初十日 脈沉微數

於朮一兩 半夏一兩 竹茹一兩 澤瀉二兩 茯苓塊一兩

甘瀾水八碗煮取三碗渣再煮一碗分四次服

丸方 半夏八兩 澤瀉八兩 雲苓塊六兩 天麻八兩 白朮六兩

共為細末神麴糊蘆汁為丸如桐子大每服三錢日再服重則二服

丙寅二月廿五日 陶氏三十歲 痰飲脈洪數咳嗽倚息不得卧有汗胸痺

生石膏八錢 桂枝五錢 老厚樸三錢 半夏六錢 杏仁泥五錢

小枳實五錢 廣皮二錢 炙甘草三錢 煮三盃分三次服

某 懸飲者水在肝也非下不可但初次診視且用輕法

半夏 一兩 旋覆花 四錢 生香附 五錢 降香末 三錢 青皮 二錢

廣皮 三錢 蘇子霜 三錢 煮三盃分三次服

己巳二月十六日 佟氏 七十歲 脈沉細而不調喘滿短氣心悸氣上阻胸咳嗽倚息不得

卧乃中焦痰飲下焦濁陰爲患年老全賴陽氣生活茲陰氣陰邪上僭如此何以克當勉與通陽降濁法

半夏 二兩 旋覆花 四錢 秫米 一合 小枳實 一兩 茯苓 六錢

廣皮 六錢 乾姜 六錢 煮三碗分三次服

十七日 懸飲內痛腸鳴非下不可以老年久虛且不敢下止有降逆而已

姜半夏 二兩 桂枝 五錢 廣皮 五錢 薤白 五錢

小枳實 一兩 秫米 四錢 通目 四錢 生姜 一兩

旋覆花 三錢 包煎 煮三碗分三次服

十八日 年近八旬五飲俱備兼之下焦濁陰隨肝上逆極迫心火不得下降以致

胸滿而澀澀然無奈兩用通陽降逆絲毫不應蓋老年真陽太虛一刻難生難長故陰凝一時難退也議於前方內加香開一法

半夏 一兩 桂枝 六錢 小枳實 一兩 括蘘 三錢 薤白 三錢

乾姜 五錢 茯苓 連皮 一兩 沈香 研細末 二錢 廣皮 五錢 生薑 一兩

降香 三錢 煮三碗分三次服

十九 五飲而兼濁陰上攻昨用苓桂重伐腎邪大辛以開中陽雖見小效大勢

陰太盛而陽太衰恐即時難以復辟也勉與齊通三焦之陽法

桂枝 六錢 姜半夏 六錢 厚樸 三錢 公丁香 三錢 茯苓 一兩

乾姜 五錢 黑沈香 三錢 薤白 四錢 小枳實 六錢 生薑 一兩

廣皮 四錢 肉桂 研細末 二錢 煮三碗分三次服

二十 仍宗前法而小變之

桂枝 六錢 姜半夏 八錢 乾姜 五錢 茯苓塊 一兩 薤白 三錢

廣皮 四錢 小枳實 五錢 肉桂 三錢 炒川椒 五錢 厚樸 三錢

生薑 一兩 煮三盃分三次服

廿三 膀胱已開今日可無伐腎邪心下氣阻不能寐仍然議中焦降逆法令得

寐

代赭石 八錢 姜半夏 二兩 旋覆花 五錢 秫米 一合 廣皮 五錢

小枳實 八錢 生薑自然汁 沖 煮三碗分三次服

廿四 昨用降逆和胃業已見效但逆氣雖降仍然有時上阻陰霾太重肝氣厥

逆也

代赭石 八錢 半夏 一兩 旋覆花 四錢 包煎茯苓 連皮 姜汁 沖半盃

小枳實 六錢 廣皮 四錢 煮三碗分三次服

乙酉正月 廿五日 陳 四十歲 病由瘡邪傷胃正虛邪實六脈俱結且有痰塊塞滯經絡

遂道病有三虛一實者先治其實後治其虛

薑半夏 六錢 茯苓塊 五錢 杏仁泥 一兩 驚眼枳實 四錢 廣皮 三錢

蘇子霜 二錢 甘瀾水八碗煮取三碗分早中晚三次服二帖

廿八 脊痛痺也右腿偏轉痿也咳嗽而喘支飲射肺也日久不愈皆誤補用熟

地等壅塞隧道之故服洪

生石膏 三兩 桂枝 五錢 茯苓皮 五錢 姜半夏 五錢

杏仁泥 五錢 防己 四錢 片姜黃 三錢 廣皮炭 三錢

薏仁 五錢 煮四碗分四次服

兩帖後退生石膏一兩加 赤茯苓塊 一兩

再兩帖後復加生石膏 一兩 以左乳傍有結核作痛加青橘葉 五錢

二月初六日 痺夾痰飲與開痺蠲飲法現在痺解而飲未除脈之洪者亦減病減者

減其製

姜半夏 五錢 桂枝 五錢 茯苓 六錢 防己 三錢 小枳實 三錢

青橘葉 三錢 薏仁 五錢 廣皮 三錢 煮三盃分三次服

初八日 加小枳實 二錢 廣皮 二錢 飛滑石 六錢

初九日 加生石膏 一兩

十一日 肝鬱夾痰飲咳嗽痰多吐瘀血

旋覆花 三錢 包煎 薤仁 二錢 桃仁泥 二錢 廣皮炭 二錢

姜半夏 六錢 青皮 二錢 降香末 三錢 青橘葉 二錢

蘇子霜 三錢 歸鬚 二錢 煮三盃分三次服

又 痰飲夾肝鬱吐出瘀血後以兩和肝胃為主

丸方 雲苓 八兩 連皮 香附 六兩 生薏仁 八兩 半夏 十兩

鬱金 二兩 澤瀉 八兩 益智仁 四兩 廣皮 五兩

共為極細末神麴水法為丸如小梧子大每服三錢日三服開水送下

六月初五日 醫澤行令脈弦細胃不開渴而小便短澀渴者與猪苓湯法

飛滑石 六錢 猪苓 五錢 雲苓 四錢 澤瀉 五錢 姜半夏 四錢

益智仁 一錢 廣皮 三錢 煮三盃分三次服胃開即止

初六 痰飲之質冒暑欲嘔六脈俱弦雖渴甚難用寒涼與局方消暑丸法

姜半夏 八錢 茯苓 四錢 藿香梗 三錢 廣皮 三錢 生甘草 一錢

生姜汁 每盃沖 煮三盃分三次服

初八 病減者減其製減半夏四錢茯苓二錢

十二 腰以下腫當利小便渴而小便短議渴者與猪苓湯例

飛滑石 二錢 猪苓 八錢 半夏 四錢 澤瀉 八錢 雲茯苓 六錢

煮三盃分三次服以渴減腫消為度

十四 脈沈細胃不開減猪苓三錢澤瀉三錢飛滑石三錢加

廣皮 三錢 藿香梗 三錢 益智仁 三錢

十六 暑溼病退小便已長陽氣不振與通補陽氣

雲茯塊 五錢 桂枝 三錢 茅蒼朮 二錢 半夏 三錢 生薏仁 五錢

白蔻仁 一錢 廣皮 二錢 炙甘草 二錢 煮三盃分三次服

十七日 頭脹胸悶脈緩氣歉暑必夾溼也

藿香 半梗半 雲苓皮 五錢 杏仁 三錢 半夏 三錢 薏仁 五錢

白蔻仁 二錢 廣皮 三錢 煮三盃分三次服

十九日 小便濁加 猪苓 四錢 溼瀉 四錢

廿四日 暑月頭脹微痛與清上焦

藿香葉 三錢 薄荷 一錢 荷葉邊 去蒂 一張

廿五日 六脈陽微暑溼之餘小便白濁與分利法

萆薢 五錢 生薏仁 五錢 桂枝 三錢 益智仁 三錢 猪苓 三錢

蒼朮 三錢 雲苓皮 五錢 澤瀉 三錢 煮三盃分三次服

七月十九日 溼熱為病與苦辛淡法

半夏 五錢 飛滑石 六錢 桂枝 三錢 猪苓 三錢 杏仁 三錢 澤瀉 三錢

木通 三錢 雲苓皮 五錢 生慧仁 五錢 煮三盃分三次服

日廿二 溼熱爲病與苦辛淡法小便已長胃不開與闔陽明

半夏 六錢 茯苓皮 五錢 廣皮 三錢 生姜 三錢

薏仁 五錢 益智仁 三錢 煮三盃分三次服

日廿五 加 桂枝 三錢 枳實 三錢 白朮 三錢

九月廿一日 痰飲喘咳脈弦與小青龍法

姜半夏 五錢 桂枝 三錢 炒白芍 二錢 杏仁泥 四錢

小枳實 三錢 乾姜 二錢 五味子 二錢 廣皮 三錢

炙甘草 一錢 煮三盃分三次服

日廿四 痰飲脇痛而咳嗽是謂懸飲懸飲者水在肝也脈弦數水在內外風未淨

也

薑半夏 六錢 杏仁 三錢 葶藶子 二錢 香附 三錢 桂枝尖 三錢

旋覆花 三錢 包煎 青蒿 三錢 黃芩炭 一錢 五分 廣皮 二錢 小枳實 四錢

生薑汁 三小匙 煮三盃分三次服

廿五日 身熱退去青蒿黃芩炭葶藶子加 杏仁 二錢

廿七日 痰飲脇痛而咳嗽是謂懸飲水在肝也脈弦數

半夏 六錢 桂枝尖 三錢 小枳實 三錢 旋覆花 三錢 包煎

杏仁 三錢 蘇子霜 三錢 降香末 三錢 生薑汁 三匙

香附 三錢 廣皮 二錢 煮三盃分三次服

廿九日 病減者減其製減半夏三錢枳實一錢蘇子一錢降香一錢桂枝一錢連

前共服五帖收功

乙酉四月 錢 十七歲 春初前曾不寐與胃不和之靈樞半夏湯服至二十帖始

得寐茲胃仍不甚和猶有不寐之弊納食不旺再與和胃

半夏 六錢 生薏仁 五錢 白薏仁 一錢 益智仁 一錢 雲苓 四錢

姜汁 小匙 沖三 廣皮炭 一錢 煮三盃分二次服

備用方 肝遺熱於腦則成鼻淵蒼耳子散主之

辛夷 一兩 蒼耳子 一兩 連翹 連心 苦桔梗 五錢 桑葉 六錢

銀花 八錢 茶菊花 六錢 甘草 三錢 黃芩炭 二錢 薄荷 二錢

其為極細末每服二錢兩前茶調日二次

五月初一日 胃不和數與和胃已得寐進食夜眠必流口水者經謂胃熱則蟲動蟲

動則廉泉開廉泉開則液自出與辛涼和胃法

半夏 六錢 生石膏 四錢 茯苓 連皮 白薏皮 一錢 杏仁 三錢

薏仁 五錢 生薑汁 每盃沖 煮三盃分三次服四帖

初六日 口水減牙痛脈如故再服四帖

十一日 方如前再服四帖

日十六 風淫所勝治以辛涼佐以苦甘

金銀花 三錢

芥穗 八分

苦桔梗 二錢

連翹 二錢

香豆豉 三錢

杏仁 二錢

生甘草 一錢

桑葉 一錢

煮兩盃分二次服熱退爲度 二帖熱退

日十八 胃熱夜間口中液自出與和胃陰法

生石膏 六錢

半夏 五錢

茯苓 五錢

麥冬 不去心 三錢

白蔻仁 一錢五分

煮三盃分三次服

日廿二 諸症皆減去石膏加 麥冬 二錢

日廿八 胃中向有飲聚不寐服半夏湯已愈後因痰涎自出與涼陽明亦減餘飲

未除與服外臺茯苓飲意

茯苓 五錢

洋參 二錢

生薑 三片

半夏 三錢

麥冬 不去心 一錢

大棗 去核 二枚

廣皮 一錢五分

枳實 一錢五分

煮兩盃分二次服

乙酉四月 吳 五十六歲 六脈洪數右寸獨大酒客痰多肺熱之至

生石膏 四兩 半夏 五錢 薏仁 五錢 杏仁 五錢

茯苓皮 五錢 防己 三錢 煮三椀分三次服

五月初十日 加 廣皮 三錢 至五月二十日其服二十帖

廿六日 酒客形體壯盛而陽萎其為溼中生熱非精血之虛其象顯然與諸痿獨

取陽明法

生石膏 三兩 半夏 五錢 防己 四錢 薏仁 八錢 黃柏 五錢

茯苓皮 八錢 木通 三錢 煮三椀分三次服

六月十日 去黃柏二錢木通三錢以喉嚨太久今可兼清肺氣加

苦桔梗 三錢 飛滑石 六錢 甘草 一錢

二十日 脈洪數石大於左喉啞痰多 戒油膩

生石膏 四兩 半夏 六錢 蘇葉 半椀 炙甘草 二錢

吳氏醫案

痰飲

聖

苦桔梗 三錢

杏仁 五錢

煮三碗分三次服

七月廿一日

生石膏 三兩

半夏 六錢

苦桔梗 四錢

生甘草 一錢

茯苓皮 六錢

杏仁 四錢

煮三盃分三次服

八月初四日

右寸脈獨大金實無聲已效而未全愈照前方再服三劑前後共服八

十餘劑計石膏三百數十兩

乙酉五月初二日

嚴 九歲

六脈弦細短瀉吐血三年不愈兼有痰飲咳嗽五更汗出

經謂陽絡傷則血上溢要知絡之所以傷者有寒有熱並非人之有絡只許陽火傷之不準寒水傷之也今人見血投涼見血補陰爲醫士一大痼疾醫士之疾不愈安望病家之病愈哉此症陽欲亡矣已難救治勉照脈症立方

姜半夏 六錢

焦白芍 三錢

乾姜炭 三錢

桂枝木 三錢

茯苓塊 五錢

五味子 二錢 廣皮炭 三錢 小枳實 二錢 煮三盃分三次服

初六 覆診據云飲食已增午後之五心煩熱如故脈稍和緩諸病必究寢食得穀者昌方無可轉至午後之熱方即甘溫除大熱法也因脈稍和緩去乾姜炭

十三 前後其服過十劑汗斂食增血並不吐頭中發空得甜食則咳減中氣虛也加 甘草 三錢 以補中氣再服四帖脈仍緊故也

十七 前後其服十四帖諸病向安惟脈之弦緊如故咳甚則欲嘔於原方去五味子減甘草再服四帖

廿一 諸症皆漸減痰亦漸厚心悸甚加 枳實 一錢 再服四帖

廿五 脈弦細如故咳嗽日減夜甚陽微陰盛可知午後身熱已減惟食後反覺嘈雜胸中有水狀少時即平於原方加 乾姜 一錢 枳實 二錢

三十 汗止嗽減五心煩熱亦減脈弦數夜間咳甚服熱藥反不渴飲尚重也病

痰飲者冬夏難治

茯苓塊

五錢

桂枝

三錢

半夏

六錢

五味子

一錢五分

小枳實

五錢

薏仁

五錢

白芍

三錢

廣皮炭

五錢
存性

炙甘草

一錢

乾姜

一錢

煮三盃分三次服

六月初四日

前方已服四帖脈弦緊不數仍不知渴於前方內加

炙甘草

一錢五分

乾姜

二錢

再服三帖

初八日

脈弦緊如故噎咳如故舌白滑甚加

桂枝

二錢

再加乾姜

三錢

十二日

脈之短濇退而弦細如故痰飲仍重於前方內加

桂枝

二錢

再加乾姜

二錢

茯苓

三錢

以化飲

十七日

夜咳已止是其佳處咳來日淺亦是最好左脈沈細右脈弦緊飲未盡除

至遍身骨痛久病之故古人云勞者溫之甘溫調營衛而復胃氣胃旺進

食久久自愈病減者減其製

桂枝 三錢 五味子 一錢五分 乾姜 三錢 半夏 五錢 枳實 五錢

廣皮 三錢 炙甘草 二錢 煮三盃分三次服

續飲丸 痰飲久聚未能一時猝去業已見效與丸藥緩化可也戒生冷惱怒

桂枝 半觔 小枳實 四兩 乾姜 六兩 蒼朮炭 六兩 茯苓 觔半

半夏 一觔 益智仁 四兩 廣皮 十二兩 炙甘草 六兩

共為細末神麴糊為丸如梧子大每服三錢日三服飲甚時服小青龍湯

乙酉五月初十日 陳 五十歲 人尚未老陽痿多年眩冒昏迷胸中如傷油膩狀飲水多

則胃不快此伏飲眩冒症也先與白朮澤瀉湯逐其飲再議緩治溼熱之陽痿豈有六脈俱弦細而悉用熱地久服六味之理哉

冬於朮 二兩 澤瀉 二兩 煮三盃分三次服

十三日 已效而未盡除再服原方十數帖而愈

乙酉五月初一日 李 四十歲 其人向有痰飲至冬季水旺之時必發後因伏暑成痢痢

後便澹竟夜不寐者多日寒熱飢飽皆不自知大便不通按暑必挾溼況素有痰飲飲即溼水之所化醫者毫不識病以致如此卧牀褥而不得起不亦冤哉議不食不飢不便不寐九竅不和皆屬胃病例與靈樞半夏湯令得寐再商

姜半夏

二兩

秫米

二合

急流水八盃煮取三盃分三次服得寐爲度

日十一

諸竅不和六脈純陰皆痰飲爲呆膩補藥所閉昨日用半夏湯已得寐而未熟再服前方三帖續用小青龍去表藥加廣皮枳實以和其飲蓋現在面色光亮水主明也六脈有陰無陽飲爲陰邪故也左脈弦甚經謂墮弦飲辭也有一症必有一症之色脈何醫者盲無所知吾不知伊一生所學何事寧不愧死

姜半夏

六錢

桂枝

五錢

五味子

一錢

炒白芍

三錢

小枳實 五錢 乾姜 二錢 炙甘草 三錢 廣皮 三錢

甘瀾水八盃煮成三盃分三次服

十八日 胃之所以不和者二惡淫而陽困也昨日純剛大燥以復胃陽今脈象較

前生動胃陽已有生動之機但小便白濁淫氣尚未暢行胃終不得和也

與開太陽闔陽明法

姜半夏 二兩 秫米 一合 豬苓 六錢 桂枝 四錢 茯苓皮 六錢

飛滑石 三錢 廣皮 三錢 澤瀉 六錢 通草 一錢

流水十一碗煮成四碗分早中晚夜四次服

六月初三日 於原方內去滑石通草加 川椒 炒去汗 三錢

乙酉五月十六日 高 五十 脈弦痰飲喘咳與小青龍去麻辛加 廣皮枳實

姜半夏 六錢 桂枝 五錢 小枳實 五錢 廣皮 三錢 炙甘草 三錢

五味子 二錢 白芍 三錢 乾姜 二錢 煮三盃分三次服二帖

十八日 已見小效 汗多加 淨麻黃根 三錢

二十日 病減者 減其製去桂枝枳實各二錢

廿一日 服前藥 汗少惟善噓 周身痠痛於原方減乾姜一錢加

杏仁 三錢 防己 三錢

乙酉五月 廿七日 董 四十歲 脈沈細 弦弱咳嗽夜甚久而不愈 飲也最忌補陰 補陰必

死以飲為陰 邪脈為陰脈也 經曰無實實

桂枝 六錢 小枳實 二錢 乾姜 三錢 五味子 一錢 白芍 四錢

半夏 五錢 炙甘草 一錢 廣皮 三錢 煮三盃 分三次服

六月初一日 復診加 雲苓 三錢 枳實 二錢

十七日 其人本有痰 飲服小青龍胃口已開 連日午後頗有寒熱 正當暑溼流行

之際 恐成瘧疾 且更通宣三焦

茯苓皮 五錢 杏仁 三錢 姜半夏 四錢 生薏仁 五錢

小枳實 三錢

青蒿 二錢

藿香梗 三錢

白蔻仁 一錢五分

廣皮 三錢

煮三盃分三次服

十九

寒熱已止脈微弱去蔻仁青蒿加桂枝乾姜以治其咳

廿二

咳減寒熱止胃口開嗽未盡除脈尚細小效不更方服至不咳為度

乙酉五月
初八日

某 六脈弦緊右脈沈取洪大先從腹以上腫例舌白滑無汗從溢

飲例之大青龍法減甘藥為其重而難也

生石膏 一兩

杏仁

去皮留尖五錢

桂枝 五錢

炙甘草 二錢

細辛 二錢

大棗肉 二枚

麻黃 六錢

去節

生薑 三錢

煮成三盃先服二盃覆被令微

汗佳得汗止後服不汗再服第二盃如上法

廿一

溢飲脈緊無汗咳嗽浮腫昨用大青龍汗出腫消喘咳減與開太陽陽

明法

半夏 五錢

飛滑石 五錢

茯苓 五錢

生薏仁 五錢

桂枝 一錢

五分

澤瀉三錢 蒼朮炭一錢 猪苓三錢 廣皮三錢 煮三孟分三次服

已服十數帖後加 蓮子五錢 益智仁二錢

乙酉正月 陳 七十歲 懸飲脈弦左脇不快為水在肝法當用十棗湯近八旬之

老人難任藥力與兩和肝胃可也

旋覆花三錢 包煎半夏五錢 香附五錢 廣皮三錢 小枳實三錢

淡吳萸二錢 青皮三錢 煮三孟分三次服

廿二日 前方已服十餘帖復診脈結加 杏仁泥六錢 再服三帖

壬戌正月 十三日 覺羅六十歲 酒客痰飲哮喘脈弦緊數急與小青龍去麻辛加 枳實

橘皮湯不應右脇痛甚此懸飲也故與治支飲之小青龍不應應與十棗湯以十棗太峻降用控涎丹

甘遂五錢 大戟五錢 白芥子五錢

其為細末神麴糊丸如梧子大先服十三丸不知漸加至二十一丸以

得快便下黑綠水爲度三服而水下喘止繼以和胃收功

汪室女^{十七歲}

伏暑夾痰飲與三仁湯重加半夏廣皮屢效而熱不退痰不除右

脈微結中有痰塊壅塞隧道因延刻正谷兄針中泉穴紫血出後繼咳者痰二口以後用藥無不見效半月後伏暑痰飲皆愈矣

甲子八月
初十日

錢氏^{三十歲}

咳嗽胃中停水與小青龍去麻辛重加枳實廣皮五帖已

愈八九因回母家爲父祝壽大開酒肉其父亦時醫也性喜用人參愛其女遂用六君子湯服關東參數十帖將近一年胸中積水脹而且痛又延其父視之所用之藥大抵不出守神中焦之外愈治愈脹愈治愈痛以致胸高不可以俯夜坐不可以卧已數月不食矣其翁見勢已急力辭其父延余治之余見其目欲努出面色青黃胸大脹痛不可忍六脈弦緊七八至之多余曰勢急矣斷非緩藥所能救因服巴豆霜三分下黑水將近一桶勢稍平以和脾胃藥調之三四日後漸平胃大開於是吃羊肉飯三十

二枚胃中大痛一晝夜又用巴豆霜一分五厘下後痛止嚴禁血肉通補
脾胃一月而安

乙酉正月 三十日 起

四十 太陽痺則腰脊痛或左或右風勝則引也或喘或不喘者

中焦留飲上泛則喘不逆則不喘也切戒生冷猪肉與一切補藥周年可
取六脈洪大已極石膏用少萬不見效命且難保

生石膏

六兩

桂枝

五錢

小枳實

五錢

生薑仁

五錢

姜半夏

五錢

杏仁

五錢

蜜芩皮

五錢

黃柏炭

二錢

白通草

一錢

防己

四錢

煮三益身三次服四帖

二月初三日

復診於前方內加

猪苓

三錢

飛滑石

一兩

小枳實

三錢

四帖

初七日

於前方內去半夏猪苓加

海桐皮

三錢

片子姜黃

二錢

晚露砂

三錢

柏一錢

服至廿五日止計十八帖於前方再加桑皮

三錢

廿六日

於前方用石膏

四兩

去黃柏炭加

姜半夏

五錢

廿七日兩日減石膏止留二兩

廿九日三石膏仍用四兩因拜埽停藥六天

初九日石膏每劑用二兩

初十日右手脈洪大已減石膏只用一兩

十一日每日用石膏二兩

十三日石膏每天用一兩

十五日至十九日因感燥氣停藥五天

二十日石膏每帖用一兩

廿二日至三十日每劑石膏用二兩共服九帖

四月十五日自淮安復至紹興又診得洪大之脈較前已減七八然較之平脈仍大

而有力現在小便赤濁牙縫臭昧復出痺痛雖止陽明太陽兩經溼熱未

淨太陰化氣未復

生石膏 四兩 杏仁 四錢 雲苓皮 五錢 飛滑石 六錢 海金砂 五錢

晚蠶砂 三錢 木通 三錢 薏仁 五錢 煮三益分三次服四帖

十九日 脈漸退減石膏至二兩加 姜半夏 五錢 廣皮 三錢

二十日至 每日用石膏一兩

廿二日至 每日用石膏二兩

廿六日 小便不利

生石膏 四兩 杏仁 四錢 姜半夏 五錢 飛滑石 六錢

生薏仁 五錢 木通 三錢 茯苓皮 五錢 海金砂 五錢

陳皮 三錢 煮三益分三次服四帖

五月初一日 感受風寒服桂枝湯

初四日 仍服前廿七日方三帖

初七日 內飲招外風為病

姜半夏 五錢

桂枝 四錢

杏仁 三錢

白芍 二錢

小枳實 五錢

防己 三錢

乾姜 一錢

廣皮 三錢

炙甘草 一錢五分

煮三盃分三次服其第一盃服後即啜稀熱粥一椀覆

被令微汗即解得汗後餘藥不必啜粥服四帖

日十一

前因風寒夾飲之故用小青龍法現在風寒解而飲未除脈復洪大仍與

大青龍與木防己湯合法兼治飲與痺也

生石膏 六錢

桂枝 六錢

防己 四錢

茯苓皮 六錢

飛滑石 六錢

半夏 六錢

木通 三錢

小枳實 三錢

杏仁 四錢

廣皮 三錢

煮三盃分三次服

日十四

其人本有痺症痰飲現屆盛暑發泄暑溼傷氣故四肢痠軟少氣口中膠

膩欲嘔與局方消暑丸意

茯苓 連皮 一兩

炙甘草 三錢

半夏 六錢

生姜汁 三匙

荷葉去帶三錢 煮三盃分三次服

十九日至
廿三日 停藥

廿四日 仍服十一日方至六月初七日止服十一帖

六月初
八日 停藥

十八日 氣急欲喘新感暑溼之故於原方內加 小枳實二錢 廣皮二錢 服五帖

廿三日

生石膏 六錢 桂枝 四錢 半夏 六錢 飛滑石 六錢

茯苓皮 六錢 杏仁 四錢 防己 四錢 廣皮 三錢

小枳實 四錢 木通 三錢 煮三盃分三次服四帖

廿七日 於原方內減石膏三錢加 飛滑石 六錢 共成一兩二錢木通二錢 共成

五錢晚蠶砂三錢

廿九日 渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之

蒼朮三錢 炒枯 桂枝三錢 茯苓皮六錢 半夏五錢 猪苓四錢

澤瀉四錢 藿香三錢 生姜汁三匙 煮三盃分三次服

七月初二日 飲食有難化之象於原方內去蒼朮加 廣皮炭四錢 神麴三錢 益智

仁二錢 小枳實三錢 以通胃腑竝醒脾陽

初七日 右脈洪數六腑不和食後惡心二便不來暑溼所干之故議宜三焦

生石膏三兩 茯苓皮六錢 黃芩炭三錢 飛滑石六錢

生薏仁五錢 姜半夏五錢 小枳實三錢 益智仁三錢

白薏仁一錢 五分 廣皮三錢 生薑三片 煮三盃分三次服

初九日 加 益智仁 小枳實

初十日 中焦停飲晚食倒飽是脾陽不伸之故一以理脾陽為法

姜半夏五錢 茯苓五錢 益智仁一錢 五分 川椒炭八分

生薏仁五錢 廣皮三錢 小枳實二錢 煨草果五分

白薏仁一錢五分 煮三盃分三次服

十七 停飲兼痺脈洪向用石膏並不見效數日前因食後倒飽脈不大石膏已用至三十觔之多轉用溫醒脾陽絲毫不應水之蓄聚如故跗腫不消胃反不開右脈復洪大力小便短思天下無肺者無溺肺寒者溺短肺熱者無溺仍用石膏涼肺胃

生石膏四兩 桂枝三錢 枳實五錢 防己四錢 姜半夏五錢

生薏仁五錢 麝皮五錢 煮三盃分三次服

廿一 於前方內加 茯苓皮五錢 杉皮五錢 減石膏二兩

廿二 日至 石膏只用四兩一帖

廿四 日至 石膏每帖只用二兩

廿五 日至 飲聚不行小便已清少時即變臭濁六腑之不通可知大藥已用不少而

猶然如是病機之頑鈍又可知矣議暫用重劑餘有原案

生石膏 四兩

杏仁 八錢

雲苓皮 八錢

飛滑石 一兩

姜半夏 八錢

防己 三錢

海金砂 八錢

小枳實 五錢

廣皮 四錢

煮三盃分三次服

八月初一 加石膏二兩

初二 又加石膏二兩

初七 減去廣皮四錢小枳實二錢

初十 脈之洪大不減加石膏二兩

十一日至廿七日 仍服前方

九月初四日 服石膏至五十觔之多而脈猶浮洪千古來未有如是之頑病皆誤下

傷正於前誤補留邪於後之累今日去補陽明藥蓋陽明之脈大也

生石膏 八兩 防己 五錢 雲苓皮 一兩 木通 三錢 飛滑石 二兩

杏仁泥 一兩 小枳實 五錢 煮四盃分四次服

專以苦淡行水服兩帖再商

初七日復診加 生石膏四兩共成十二兩服四帖

十三日脈洪滑痰飲未除晨起微喘足跗腫未消盡餘有原案

生石膏 八兩 半夏 六錢 生薏仁 六錢 飛滑石 一兩

雲苓皮 六錢 杏仁 四錢 葶藶子 三錢 木通 四錢

十五日氣已不急去葶藶于右脈仍洪加 石膏一倍共成一觔

十六日氣急者得葶藶而止右脈之洪大者得石膏一觔大減病減者減其製但

脈仍滑數加行痰飲

生石膏 六兩 半夏 一兩 枳實 三錢 杏仁 四錢 雲苓皮 五錢

旋覆花 四錢 包煎 廣皮 四錢 香附 五錢 煮四五分四次服

十八日脈漸小減石膏二兩服二帖

二十日脈洪數加 石膏八兩共成十二兩服二帖

廿二 脈洪數減減石膏六兩加 葶藶子一錢五分

廿五 脈之洪大者得石膏一觔業經大減病減者減其製俟脈復洪大有力再

酌加其製

生石膏十二兩 半夏一兩 香附五錢 枳實五錢 雲苓皮五錢

旋覆花四錢 包煎 廣皮四錢 杏仁四錢 煮四孟分四次服

廿九 小便短於原方加 飛滑石一兩

妙應丸 金匱謂凡病至其年月日時復發者當下之此證痰飲兼痺自正月

服藥至十月石膏將近百觔之多雖無不見效究未拔除病根左脇間漉漉有聲不時喘咳此水在肺也金匱水在肺十棗湯主之又謂偏弦飲漉又謂咳家之脈弦尙有水十棗湯主之又謂咳家一百日至一歲不死者十棗湯主之合而觀之此症當用十棗無疑但十棗太峻南人膽怯未敢驟用降用妙應丸續續下之庶無差忒也

製甘遂 五錢

製大戟 五錢

白芥子 五錢

其為細末神麴糊為丸如小梧子大從三十丸服起得下痰水即止停數日水不盡再服以盡為度

十月初二日 服妙應丸二分六厘大棗三枚煎湯下清晨服約二刻先從左脇作響

墜痛至少腹便下綠水膠痰枕許

初三日 服妙應丸二分六厘大棗二枚煎湯下便下痰水如前湯藥未服

初四日 氣喘於前方內加 石膏 四兩 其成一觔杏仁 四錢 其成八錢廣皮 二錢

其成六錢加桂枝 六錢 生薑 四錢 服四帖

初八日 生石膏 一觔 半夏 一兩 茯苓皮 六錢 飛滑石 一兩

小枳實 五錢 杏仁 八錢 旋覆花 四錢 蘇子霜 一錢

廣皮 三錢 煮四盃分四次服三帖

十一日 服妙應丸三分

日十二 脈仍洪大有力

生石膏 八兩 薤仁 六錢 半夏 六錢 香附 三錢 雲苓皮 六錢

旋覆花 四錢 包煎 杏仁 四錢 廣皮 三錢 煮三盃分三次服

日十三 飛滑石 一兩 半夏 一兩 杏仁 八錢 桂枝 六錢 枳實 五錢 茯苓皮 五錢

旋覆花 四錢 包煎 廣皮 四錢 香附 三錢 蘇子霜 二錢 煮三盃分三次服

日二十 去香附加 蘇子霜

日廿二 妙應丸三分四厘服之即下痰水

日廿九 妙應丸三分八厘服之下痰如前

日十一 右脈洪數本有聚飲小便不長

生石膏 一觔 飛滑石 一兩 小枳實 四錢 半夏 六錢

茯苓皮 六錢 晚蠶砂 三錢 生薤仁 六錢 杏仁 六錢

白通草 二錢 煮三盃分三次服

初六服妙應丸三分八厘下痰水如前

十一於前方加 鬱金 三錢

十二於前方加 廣皮 三錢 石膏 八兩

十三於前方加 枳實 二錢 旋覆花 四錢 絹包

十四於前方加 蘇子霜 四錢

十五服妙應丸四分六厘下痰水如前

十六服妙應丸六分下痰水如前

十七痰飲喘咳石脈洪左關獨浮與建金制木法

生石膏 八兩 半夏 六錢 杏仁 六錢 香附 四錢 旋覆花 四錢 阿膠 包煎

蘇子霜 三錢 青皮 三錢 煮三盃分三次服

廿二服妙應丸六分自服丸藥每次皆下痰水惟此次未下以服藥後即食粥

也

廿三日 服妙應丸六分大便仍行痰水

廿七日 洪大之脈已退惟兩關獨浮右大於左而兼實木陷入土與兩利肝胃兼

開膀胱小便短而水易停故也

飛滑石 一兩

半夏 六錢

雲苓皮 六錢

白芍 四錢
酒炒

旋覆花 三錢
包煎

香附 三錢

蘇子霜 三錢

廣皮 三錢

青皮 二錢

煮三盃分三次服

十二月初一日 數日不服石膏右脈復然洪數左關之獨浮者亦未十分平靜與金木

同治法

生石膏 六兩

半夏 六錢

雲苓皮 六錢

杏仁 六錢

飛滑石 一兩

小枳實 六錢

香附 四錢

旋覆花 四錢
包煎

煮三盃分三次服

以後凡右脈大者服此小即停止

初二日 服妙應丸六分下痰水如前

吳氏醫案

痰飲

窗

初三日 仍服初一日原方二帖

初五日 於初一日方內加 桂枝 五錢 廣皮 四錢 以畏寒故也服五帖

初十日 服妙應丸八分下痰水如前

十一日 於前方內去桂枝廣皮脈不小故也再服五帖

十六日 服妙應丸一錢仍下痰水如前

丁亥正月 曹 四十歲 咳嗽脈洪大數實面色黧黑已為難治況左脇版痛卧不

着蓆此水在肝也更為重極之症先與大青龍以平其脈再議逐脇下之

飲

生石膏 四兩 麻黃 去節 三錢 生薑 五片 炙甘草 三錢

杏仁泥 五錢 桂枝 三錢 大棗 去核 三枚 細辛 二錢

煮三盃先服一盃得汗止後服不汗再服

二十日 痰飲喘咳無汗六脈洪大數實與大青龍全劑脈小咳減惟口渴思涼未

除脈仍帶數仍與大青龍去麻辛可也

生石膏三兩先煎代水桂枝三錢小枳實三錢姜半夏六錢杏仁泥六錢

雲苓半皮半塊六錢炙甘草三錢煮三盃分三次服

廿一 於原方內減石膏一兩加 枳實二錢廣皮五錢

廿二 痰飲喘咳左邊卧不着席脈洪大數實與大青龍三次見效脈已平復惟

仍數耳

生石膏二兩雲苓半塊半皮六錢桂枝三錢小枳實三錢姜半夏六錢

炙甘草三錢杏仁泥五錢廣皮五錢煮三盃分三次服

丙戌四月十五日 陳女十五歲六脈弦數午後身熱前曾腹脹泄瀉痰多喘咳氣上阻胸

內飲招外風爲病兼有伏暑之象與通宣三焦

雲苓塊六錢生薏仁五錢白薤仁一錢五分姜半夏五錢杏仁泥三錢

旋覆花三錢包煎黃芩炭一錢五分藿香梗三錢煮三盃分三次服

十八 六脈弦數較前雖減而身熱未除喘咳亦減胃少開鬱少舒仍宗前法餘

有原案

雲苓皮 六錢 生薏仁 五錢 廣鬱金 二錢 姜半夏 五錢

旋覆花 三錢 黃芩炭 三錢 白蔻仁 二錢 藿香梗 三錢

杏仁 三錢 青皮 二錢 青蒿 二錢 煮三盃分三次服

二十 肝鬱夾痰飲咳嗽氣上阻胸寒熱與宣肝絡以開鬱和胃以逐飲降肝氣

鎮肝逆以去氣阻調營衛以止寒熱餘有原案

代赭石 五錢 桂枝 三錢 炒白芍 三錢 旋覆花 三錢

姜半夏 五錢 香附 三錢 廣鬱金 二錢 歸橫翳 二錢

降香末 三錢 廣皮 三錢 煮三盃分三次服

廿三 肝鬱夾痰飲兼有伏暑寒熱前與通宣三焦繼以調和營衛宣肝鬱逐痰

飲兩法俱效仍宗第二法

代赭石

三錢煅飛

桂枝

三錢

生薏仁

五錢

香附

三錢

旋覆花

三錢包煎

炒白芍

三錢

歸嶺

二錢

姜半夏

五錢

廣皮

三錢

白蔻仁

一錢

廣鬱金

二錢

降香末

二錢

煮三盃分三次服

廿六

脈大則病進脈小則病退肝鬱夾痰飲三法俱效仍以兩和肝胃調和營

衛立法

代赭石

五錢煅飛

桂枝

三錢

降香末

二錢

香附

三錢

新絳紗

三錢

炒白芍

三錢

歸嶺

一錢

旋覆花

三錢包煎

廣皮

三錢

益智仁

一錢五分

姜半夏

五錢

煮三盃分三次服

廿九

諸症向安惟餘痰飲經未行仍與兩和肝胃

茯苓塊

五錢

桂枝

三錢

姜半夏

五錢

香附

三錢

炒白芍

三錢

廣皮

三錢

降香末

三錢

生姜片

三大

全當歸

二錢

煮三盃分三次服

五月初四日 脈和昨日經行經前腹痛色紫黑今日不痛但少腹脹須服化癥回生

丹一二九

姜半夏 三錢 桂枝 二錢 香附 三錢 廣皮 二錢 焦白芍 二錢

降香末 二錢 歸鬚 二錢 生薑 三片 煮三盃分二次服

己丑正月初七日 舒氏 四十歲 痰飲喘咳夜甚脇痛少腹亦痛溺濁水在肝也經謂之懸

飲懸飲者十棗湯主之恐其太峻宗其法而不用其方

姜半夏 五錢 生薏仁 六錢 旋覆花 三錢 香附 三錢

雲苓皮 六錢 小枳實 三錢 降香末 二錢 廣皮 三錢

蘇子霜 三錢 煮三盃分三次服

己丑正月十一日 魯氏 七歲 痰飲喘咳倚息不得卧左畔更不能着席脇下有飲水在

肝也加逐肝中之飲與小青龍法

姜半夏 六錢 桂枝 四錢 廣橘皮 三錢 旋覆花 三錢 包煎

小枳實 四錢
香附 三錢
五味子 一錢五分
乾姜 四錢

炙甘草 二錢
煮三盃分三次服

十四日 痰飲喘咳倚息不得卧前與小青龍法痰少活右手今日脈結塊痰所致

重與利肺氣爲要

姜半夏 六錢
苦桔梗 五錢
杏仁 五錢
雲苓塊 五錢

小枳實 四錢
旋覆花 三錢
包煎
廣皮 三錢
蘇子霜 三錢

生薑汁 三匙
煮三盃分三次服

十八日 痰飲喘咳倚息不得卧脈結前與利肺氣治結脈法茲結脈已愈但自覺

冷氣上冲當伐其衝氣

雲苓塊 一兩
桂枝 六錢
廣橘皮 三錢
姜汁 三匙
小枳實 四錢

姜半夏 六錢
乾姜 四錢
甘瀾水煮三盃分三次服

庚寅十月十六日 潘九歲 痰飲喘咳脈弦

吳氏醫案

痰飲

卷

姜半夏 六錢 桂枝 五錢 廣橘皮 三錢 白芍 三錢 小枳實 三錢

炙甘草 三錢 乾姜 二錢 五味子 二錢 煮三盃分三次服

十八日 喘稍定而不寐與胃不和則卧不安飲以靈樞半夏湯

姜半夏 二兩 秫米 二合 甘瀾水八盃煮取三盃分三次服

廿四日 左脈弦甚所謂單弦飲澹也久飲受風因而大喘不寐與半夏湯喘止能

寐伏飲未除

姜半夏 六錢 桂枝 三錢 小枳實 三錢 乾姜 三錢 雲苓塊 五錢

炙甘草 三錢 廣皮 三錢 炒於朮 三錢 煮三盃分三次服

己丑二月初八日 覺羅氏少陽膽絡偏頭痛係上焦火病屬陽胸滿短氣不食不便咳

喘脈沈弦頭面肢腫欲小便則寒噤係中下焦水病屬陰陽水火兼病

礙難措手勉與清上焦勿犯中下二焦俟上焦愈再治下焦

連翹 三錢 牛蒡子 二錢 鉤藤 三錢 刺蒺藜 二錢

銀花 三錢 荊芥穗 一錢 丹皮 二錢 茶菊花 三錢

桑葉 三錢 煮三小盃分三次服服一帖頭痛減

初九日 痰飲誤用苦寒以致胸滿短氣便閉不食

姜半夏 八錢 小枳實 四錢 廣皮 三錢 杏仁泥 八錢 煮三盃分三次服

以大便通爲度 服一帖便通思食胸滿除但頭復微脹

壬辰正月 廿八日 珠氏 六脈沈弦細弱陽氣虛極嘔吐停水食少再吃生冷豬肉

鹹味不可救矣

茯苓塊 六錢 吳萸 三錢 橘皮 四錢 良姜 三錢 川椒炭 三錢

姜半夏 六錢 生薑 五錢 煮三茶盃分三次服

二月初二日 卽於前方內去良姜加乾姜炭 三錢

初五日 陽虛受寒服溫藥已效仍有脇脹臍痛六脈弦細

姜半夏 五錢 吳萸 二錢 厚樸 二錢 川椒炭 三錢

小茴香

三錢炒黑

良姜

二錢

香附

三錢

青皮

二錢

廣橘皮

三錢

煮三盃分三次服

初九

於前方內加

茯苓塊

五錢

日十二

陽微脈弦細脇脹減而腹痛未除

吳茱萸

三錢

烏藥

二錢

檳榔

二錢

小茴香

三錢炒

廣橘皮

三錢

良姜

三錢

青皮

二錢

生薑

三片

川椒炭

三錢

煮三小盃分三次服

日廿二

本受燥金寒氣又加肝鬱脇痛治在肝絡

新絳紗

三錢

香附

三錢

蘇子霜

三錢

旋覆花

三錢

姜半夏

五錢

青皮

二錢

川椒炭

三錢

歸橫鬚

二錢

降香末

三錢

橘皮

三錢

煮三盃分三次服

壬辰二月初五日

某 其人本有痰飲喘咳又感風溫不惡寒反惡熱口渴暮夜身熱

頭暈汗多暫與辛涼清上

連翹 三錢

苦桔梗 三錢

銀花 三錢

香豆豉 二錢

蘆根 三錢

杏仁泥 三錢

桑葉 三錢

炙甘草 一錢五分

竹葉 三錢

煮三盃分三次服

初七

痰飲喘咳又加溫熱前與辛涼茲溫熱已退服猶微數尙不能純然大溫

以治飲且與平劑爲穩

茯苓皮 六錢

杏仁 五錢

小枳實 四錢

香附 三錢

姜半夏 六錢

旋覆花 三錢

包煎橘皮 四錢

蘇子霜 三錢

煮三茶盃分三次服

初九

胃不和則卧不安與靈樞半夏湯和胃

姜半夏 二兩

秫米 一合

急流水八盃煮取三盃分三次服

十一

痰飲喘咳脈弦細

姜半夏 六錢

桂枝 四錢

五味子 一錢

焦白芍 二錢

廣橘皮 四錢

乾姜 三錢

小枳實 一錢

細辛 一錢

炙甘草 三錢

甘瀾水八盃煮取三盃分三次服

十三 痰飲喘咳與溫中降氣已效仍宗前法而進之

桂枝 三錢

小枳實 五錢

細辛 一錢

蘇子霜 三錢

杏仁 三錢

焦白芍 二錢

乾姜 三錢

廣橘皮 五錢

炙甘草 三錢

甘瀾水八盃煮取三盃分三次服

十五 痰飲喘咳已愈五六惟口乾頭暈不寐與辛能潤法

姜半夏 二兩 秫米 一合

急流水八碗煮取三碗分三次服

十八 痰飲不寐與半夏湯已寐惟短氣心悸未除汗多

姜半夏 六錢

桂枝 三錢

小枳實 三錢

雲苓塊 五錢

五味子 三錢

乾姜 三錢

炙甘草 三錢

廣橘皮 三錢

麻黃根 三錢 去淨蘆

煮三盃分三次服

廿一 痰飲喘咳俱愈又感風溫頭暈脈數身熱與辛涼法

連翹 三錢 苦桔梗 三錢 桑葉 三錢 荊芥穗 五錢

銀花 三錢 香豆豉 三錢 竹葉 二錢 炙甘草 一錢

薄荷 一錢 煮三小盃分三次服

廿三 風溫已解痰飲不寐左脇痛與兩和肝胃

姜半夏 六錢 桂枝 三錢 降香末 三錢 歸鬚 二錢

旋覆花 三錢 香附 四錢 廣橘皮 三錢 青皮 一錢

蘇子霜 三錢 秫米 一撮 煮三盃分三次服

廿五 飲脹脇下痛而咳

姜半夏 六錢 桂枝尖 三錢 香附 四錢 降香末 三錢 小枳實 四錢

旋覆花 三錢 包煎杏仁泥 三錢 乾姜 三錢 蘇子霜 三錢 廣橘皮 四錢

甘瀾水八盃煮取三盃分三次服

廿八日 病減者減其製餘有原漿

姜半夏 六錢
香附 三錢
小枳實 二錢
乾姜 三錢
旋覆花 二錢
包煎
廣橘皮 三錢
青皮 二錢
蘇子霜 二錢
煮三盃分三次服

三月初八日 痰飲未盡除脇下有癥瘕鞭塊與溫通絡法

姜半夏 五錢
香附 三錢
小枳實 三錢
旋覆花 三錢
包煎
川椒炭 三錢
乾姜 三錢
吳茱萸 二錢
蘇子霜 三錢
小茴香 三錢
炒
廣皮 三錢
煮三盃分三次服